

پایه دهم

زیست ۱

درسنامه + پرسش‌های چهارگزینه‌ای



فصل ۴: گردش مواد در بدن

درسنامه



قلب

گفتار اول

- ۳ دیواره بطن چپ ضخیم‌تر از بطن راست است. ضمناً بخشی از بطن چپ نوک قلب را می‌سازد.
- ۴ سرخرگ آنورت از بطن چپ خارج می‌شود که در ابتدای آن دریچه سینی قرار دارد.
- ۵ اولین انشعابات آنورت، سرخرگ‌های اکلیلی هستند که خون روشن را به سوی ماهیچه قلب می‌برند.
- ۶ از قوس آنورت در بالای قلب، سه سرخرگ منشعب می‌شوند که خون را به سوی سر و بازوها می‌برند.
- ۷ از بطن راست یک سرخرگ ششی خارج می‌شود که در بالای قلب به دو سرخرگ ششی (چپ و راست) تقسیم می‌شود. در ابتدای سرخرگ ششی (قبل از منشعب شدن) یک دریچه سینی وجود دارد. به عبارت دیگر سرخرگ‌های ششی چپ و راست، دریچه سینی ندارند.
- ۸ انسان چهار سیاهرگ ششی دارد که همگی خون روشن را به دهلیز چپ می‌ریزند.
- ۹ سه سیاهرگ (بزرگ سیاهرگ زیرین، بزرگ سیاهرگ زیرین و سیاهرگ اکلیلی) خون تیره را به دهلیز راست می‌ریزند.
- ۱۰ سرخرگ ششی از سیاهرگ ششی قطورتر است.
- ۱۱ **ویژه** سرخرگ ششی راست طویل‌تر از سرخرگ ششی چپ است، چون: ۱ قلب در سمت چپ قفسه سینه قرار دارد. ۲ سرخرگ ششی راست از زیر قوس آنورت عبور می‌کند. ۳ محل منشعب شدن سرخرگ ششی به دو سرخرگ ششی چپ و راست، متمایل به چپ قلب است.
- ۱۲ سرخرگ ششی از بطن راست خارج می‌شود اما در سمت چپ آنورت قرار دارد.
- ۱۳ **ویژه** ضخامت دیواره بطن راست در نزدیکی نوک قلب، کمتر از نواحی دیگر آن است.

- دقت کنید:** خون فقط از بطن‌ها خارج می‌شود. بنابراین خون فقط توسط سرخرگ آنورت و سرخرگ ششی از قلب خارج می‌شود.
- ۱۴ در محل ورود خون سیاهرگ‌ها به دهلیز، دریچه وجود ندارد.

زوم: اگر با دقت به شکل ۲ در صفحه ۴۸ ریست ۱ نگاه کنید متوجه خواهید شد که به حفرات نیمه راست قلب فقط خون تیره و به حفرات نیمه چپ قلب فقط خون روشن وارد می‌شود. با این حال نمی‌توان گفت که حفرات نیمه راست قلب با خون روشن ارتباط ندارند. چون اکسیژن و مواد غذایی مورد نیاز لایه ماهیچه‌ای در همه حفرات قلبی توسط خون روشن سرخرگ‌های اکلیلی تأمین می‌شود.

- ۱۵ **ویژه** به قلب یک انسان بالغ و سالم ۷ سیاهرگ وارد می‌شود: ۴ سیاهرگ ششی به دهلیز چپ، بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زیرین و سیاهرگ اکلیلی به دهلیز راست.
- ۱۶ سیاهرگ‌های ششی راست نسبت به سیاهرگ‌های ششی چپ طویل‌ترند؛ چون فاصله بیشتری با دهلیز چپ دارند!

- ۱۷ **ویژه** حفرات قلب انسان با ۹ رگ ارتباط دارند که فقط ۲ تای آن‌ها سرخرگ هستند و خون را از قلب خارج می‌کنند و ۷ رگ دیگر سیاهرگ هستند و خون را به قلب باز می‌گردانند.

- دقت کنید:** سرخرگ‌های اکلیلی برخلاف سیاهرگ اکلیلی با حفرات قلب ارتباطی ندارند!

۱ دستگاه گردش مواد در انسان، از قلب، رگ‌ها و خون تشکیل شده است.

ویژه مهم‌ترین وظایف دستگاه گردش مواد:

۱ انتقال گازهای تنفسی: دستگاه گردش خون انسان، اکسیژن را از جبابک‌های شش‌ها دریافت می‌کند و به یاخته‌های مختلف بدن می‌رساند. همچنین کربن دی‌اکسید را از یاخته‌های بدن دریافت کرده و آن را به جبابک‌های شش‌ها انتقال می‌دهد.

۲ انتقال مواد مغذی: مواد غذایی گوارش یافته (مثل گلوکز و آمیتواسیدها) همراه با مواد مغذی دیگر (مثل ویتامین‌ها) و آب را از روده و لنف دریافت کرده و آن‌ها را به یاخته‌های مختلف بدن می‌رساند.

۳ انتقال پیکهای شیمیایی: پیکهای شیمیایی دوربرد (مثل هورمون‌ها) از طریق جریان خون به یاخته‌های هدف می‌رسند.

۴ کمک به دفع مواد زائد: مواد زائد نیتروژن دار تولید شده توسط یاخته‌های بدن از طریق کلیه‌ها دفع می‌شوند. انتقال این مواد از پاچه‌های مختلف به کلیه‌ها توسط خون انجام می‌شود.


۵ کمک به تنظیم دمای بدن: خون با انتقال گرمای بخش‌های مختلف، به تنظیم دمای بدن کمک می‌کند.

قلب و رگ‌های متصل به آن

اصل مطلب



● قلب انسان از چهار حفره تشکیل شده است که دو حفره بالایی دهلیز و دو حفره پایینی بطن نام دارند.



● ضخامت لایه ماهیچه‌ای دیواره و گنجایش بطن‌ها بیشتر از دهلیز‌هاست.

● به حفرات نیمه راست قلب، یعنی دهلیز راست و بطن راست فقط خون تیره و به حفرات نیمه چپ قلب، یعنی دهلیز چپ و بطن چپ فقط خون روشن وارد می‌شود. به این ترتیب که خون تیره از طریق بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زیرین و همچنین سیاهرگ اکلیلی (کرونری) به دهلیز راست و از آن جا به بطن راست می‌ریزد. سپس با انقباض بطن راست، خون تیره وارد سرخرگ ششی می‌شود تا برای تبادل گازها به شش‌ها منتقل شود.

● خون روشن توسط سیاهرگ‌های ششی به قلب بازمی‌گردد و به دهلیز چپ و از آن جا به بطن چپ می‌ریزد و با انقباض بطن چپ وارد سرخرگ آنورت می‌شود تا به سراسر بدن منتقل گردد.


- ۱۸ دقت کنید:** در سطح قلب و در مجاورت رگ‌های اکلیلی، چربی زرد رنگی دیده می‌شود. این چربی‌ها موجب گرفتگی رگ‌های اکلیلی نمی‌شوند.
- ۱۹ ترکیبی** لیپوپروتئین‌های کم‌چگال (LDL) در بروز سکته‌های قلبی نقش دارند. کلسترول این لیپوپروتئین‌ها با رسوب در دیواره سرخرگ‌های اکلیلی موجب تصلب شرایین، گرفتگی رگ و در نهایت سکته می‌شود.
- ۲۰ ویژه** یاخته‌های سطح درونی حفرات قلب، همانند یاخته‌های سطح درونی رگ‌های خونی در تماس مستقیم با خون قرار دارند؛ این یاخته‌ها اکسیرن و مواد مغذی مورد نیاز خود را مستقیماً از خون می‌گیرند.

درباره‌های قلب

اصل مطلب

- قلب انسان ۴ دریچه دارد: ۱ دریچه دولختی ۲ دریچه سه‌لختی
- دریچه سینی آنورتی ۳ دریچه سینی سرخرگ ششی
- دریچه دولختی (میترال) بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد و دریچه سه‌لختی نیز بین دهلیز راست و بطن راست قرار گرفته است. این دریچه‌ها بر اثر برخورد خون از بالا باز و بر اثر برخورد خون از پایین بسته می‌شوند. در واقع هنگام استراحت قلب و همچنین هنگام انقباض دهلیزها، خون از بالا به این دریچه‌ها برخورد می‌کند و در نتیجه باز شدن دریچه‌ها، خون به بطن‌ها می‌ریزد. هنگام انقباض بطن‌های نیز برخورد خون از پایین به این دریچه‌ها سبب بسته شدن آن‌ها می‌شود که موجب جلوگیری از بازگشت خون بطن‌ها به دهلیزها می‌شود.
- دریچه‌های سینی در ابتدای سرخرگ آنورت و ابتدای سرخرگ ششی قرار دارند. هنگام انقباض بطن‌ها خون از پایین به این دریچه‌ها برخورد می‌کند و با باز شدن آن‌ها خون وارد آنورت و سرخرگ ششی می‌شود پس از پایان انقباض بطن‌ها، برخورد خون از بالا به این دریچه‌ها سبب بسته شدن آن‌ها می‌شود.

۲۱ دریچه‌های قلب بافت ماهیچه‌ای ندارند و از چین خورده‌گی بافت پوششی قلب به وجود آمدند؛ بنابراین بافت پوششی دارند و بافت پیوندی نیز به استحکام آن‌ها کمک می‌کند.



۲۲ دریچه‌های دولختی و سه‌لختی از بازگشت خون بطن‌ها به دهلیزها جلوگیری می‌کنند. این دریچه‌ها فقط هنگام انقباض بطن‌ها بسته و در سایر مواقع بازند.

۲۳ دریچه‌های سینی فقط هنگام انقباض بطن‌ها باز و در سایر مواقع بسته‌اند و از بازگشت خون سرخرگ‌های آنورت و ششی به بطن‌ها جلوگیری می‌کنند.

فلش‌بک: پرده‌های صوتی حاصل چین خورده‌گی مغاط حنجره به سمت داخل هستند؛ بنابراین پرده‌های صوتی همانند دریچه‌های قلبی بافت پوششی دارند.

۲۴ دریچه‌های سینی همانند دریچه سه‌لختی، از سه قسمت (سه لث) تشکیل شده‌اند. بنابراین از بین چهار دریچه قلبی، سه تای آن‌ها سه‌لختی هستند و فقط دریچه میترال دارای دو لث است.

۲۵ بزرگ‌ترین دریچه قلبی، سه‌لختی و کوچک‌ترین دریچه قلبی، دریچه سینی سرخرگ ششی است.

۲۶ دو سرخرگ کرونر از آنورت متشعب می‌شوند که هر یک از آن‌ها پس از جدا شدن از آنورت به دو شاخه تقسیم می‌شوند که یکی به سمت جلو و دیگری به سمت پشت قلب می‌رود.

- ۱۸** به حفرات سمت راست قلب فقط خون تیره و به حفرات سمت چپ قلب فقط خون روشن وارد می‌شود.
- ۱۹ ویژه** سطح درونی دهلیزها نسبتاً صاف است اما سطح درونی بطن‌ها ناهمواری‌هایی دارد که ناشی از وجود ماهیچه‌هایی به نام Papillary muscles است. این ماهیچه‌ها توسط طناب‌های ارجاعی ویژه‌ای به دریچه‌های دهلیزی بطنی متصل‌اند و هنگام انقباض بطن‌ها، مانع از حرکت زیاد آن‌ها به سمت دهلیز می‌شوند. اگر این محدودیت اعمال نشود، دریچه‌ها به سمت دهلیز باز می‌شوند و مقداری از خون بطن وارد دهلیز می‌شود!


جمع‌بندی حفرات قلب انسان



دهلیز چپ	بطن راست	دهلیز چپ	بطن چپ	کیفیت خون
تیره	تیره	روشن	روشن	رگ‌های ورودی
-	۳ سیاهرگ (زیرین، زبرین و اکلیلی)	-	-	رگ‌های خروجی
سرخرگ ششی	-	سرخرگ آنورت	-	گردش ششی

گردش خون عمومی و ششی

۲۰ انسان گردش خون مضافع دارد که شامل گردش خون عمومی و ششی است.



۲۱ گردش خون عمومی از بطن چپ آغاز و به دهلیز راست ختم می‌شود. گردش خون ششی نیز از بطن راست آغاز و به دهلیز چپ ختم می‌شود.

۲۲ ترکیبی در بدن انسان، بیشتر سرخرگ‌ها خون روشن دارند اما خون موجود در سرخرگ‌های ششی و سرخرگ‌های بند ناف تیره است.

۲۳ ترکیبی در بدن انسان، بیشتر سیاهرگ‌ها خون تیره دارند اما خون موجود در سیاهرگ‌های ششی و سیاهرگ بند ناف روشن است.

- ۲۴ دقت کنید:** سرخرگ‌ها و سیاهرگ اکلیلی نیز جزو گردش عمومی هستند.
- ۲۵ ویژه** بیشتر سرخرگ‌ها حاوی خون روشن و بیشتر سیاهرگ‌ها حاوی خون تیره هستند، اما ازوماً هر سرخرگی حاوی خون روشن و هر سیاهرگی حاوی خون تیره نیست! در واقع هر رگی که خون را از قلب دور می‌کند، سرخرگ و هر رگی که خون را به سوی قلب می‌برد، سیاهرگ نامیده می‌شود. به عنوان مثال سرخرگ ششی و سرخرگ‌های بند ناف خون تیره دارند؛ همچنین سیاهرگ‌های ششی و سیاهرگ بند ناف حاوی خون روشن هستند.


- ۲۶ ویژه** فشار خون سرخرگ آنورت بیشتر از فشار خون سرخرگ ششی است؛ چون بطن چپ قلب نیروی انقباضی بیشتری دارد و خون را به سراسر بدن پمپ می‌کند؛ حالی که بطن راست خون را به سوی شش‌های فرستاده نیروی انقباضی آن کمتر است.

رگ‌های اکلیلی قلب

۲۷ دو سرخرگ اکلیلی (کرونری) از ابتدای آنورت متشعب می‌شوند و خون روشن را به ماهیچه قلب می‌رسانند.

۲۸ یک سیاهرگ اکلیلی خون تیره ماهیچه قلب را جمع آوری می‌کند و به دهلیز راست می‌ریزد.

۲۹ بسته شدن سرخرگ‌های اکلیلی بر اثر لخته یا سخت شدن دیواره آن‌ها (تصلب شرایین) ممکن است باعث سکته قلبی شود که در این حالت، به بخشی از ماهیچه قلب اکسیرن نمی‌رسد و یاخته‌های آن می‌میرند. سرخرگ و سیاهرگ اکلیلی سکته قلبی، از پیامدهای بلند مدت مصرف الکل نیز هست.



ویژه ۴۲ بسته شدن دریچه‌های دولختی و سهلختی با حرکت به سمت بالا (به سمت دهلیز) اما بسته شدن دریچه‌های سینی با حرکت به سمت پایین (به سمت بطن) است!

۴۳ دریچه‌های سینی برخلاف دریچه‌های دولختی و سهلختی قطعات آویخته ندارند و در اتصال با طناب‌های ارتعاعی نیستند.

۴۴ **ویژه** دریچه‌های قلب براساس موقعیت مکانی از بالا به پایین عبارت‌اند از: ۱ دریچه سینی سرخرگ ششی ۲ دریچه سینی آنورتی ۳ دریچه دولختی ۴ دریچه سهلختی

۴۵ **ویژه** همزمان با انقباض بطن‌ها، همه دریچه‌های قلب به سمت بالا حرکت می‌کنند؛ با این حرکت، دریچه‌های دولختی و سهلختی بسته و دریچه‌های سینی باز می‌شوند.

۴۶ **ویژه** هیچ‌گاه همه دریچه‌ها نمی‌توانند به طور همزمان باز باشند؛ اما در دو زمان بسیار کوتاه، هر چهار دریچه قلبی می‌توانند به طور همزمان بسته باشند که یکی در شروع انقباض بطن‌ها و دیگری در شروع استراحت بطن‌هاست.

۴۷ همه دریچه‌های قلبی با بطن‌ها در ارتباط‌اند. اما دریچه‌های سینی با دهلیزها ارتباط ندارند. بنابراین از بین دریچه‌های قلب، فقط دریچه‌های دولختی و سهلختی با دهلیزها در ارتباط‌اند.

۴۸ **ترکیبی** در ساختار هیچ‌یک از دریچه‌های سینی، دولختی، سهلختی و لانه کبوتری، بافت ماهیچه‌ای به کار نرفته است؛ بنابراین باز و بسته شدن این دریچه‌ها به صورت غیرفعال صورت می‌گیرد؛ یعنی بدون نیاز مستقیم به ATP و یون کلسیم انجام می‌شود.

۴۹ وجود نقص در دریچه‌های دولختی و سهلختی باعث می‌شود تا هنگام انقباض بطن‌ها، مقداری خون از بطن وارد دهلیز شود و در نتیجه، مقدار کمتری خون از قلب خارج می‌شود.

۵۰ وجود نقص در دریچه‌های سینی باعث می‌شود تا هنگام انقباض بطن‌ها، مقداری خون از سرخرگ‌های ششی و آنورت به قلب بازگردد و در نتیجه، باز هم مقدار کمتری خون از قلب خارج می‌شود.

۵۱ در ابتدای سرخرگ‌های خروجی از قلب (آنورت و سرخرگ ششی) دریچه وجود دارد اما در محل ورود هیچ‌یک از سیاهرگ‌ها به قلب، دریچه وجود ندارد.

جمع‌بندی دریچه‌های قلب انسان



دریچه قلبی	محل	تعداد قطعات	مانع بازگشت خون به	زمان باز بودن
سینی آنورتی	ابتدا آنورت	۳ قطعه	بطن چپ	سیستول بطن‌ها
سینی ششی	ابتدا سرخرگ ششی	۳ قطعه	بطن راست	سیستول بطن‌ها
دولختی	بین دهلیز چپ و بطن چپ	۲ قطعه آویخته	دهلیز چپ	سیستول دولختی
سهلختی	بین دهلیز راست و بطن راست	۳ قطعه آویخته	دهلیز راست	سیستول سهلختی

* انقباض ماهیچه قلب را سیستول و استراحت آن را دیاستول می‌نامند.

جمع‌بندی صدای قلب



صدای قلبی	صدا	پیوند	ویژگی	ناشی از بسته شدن	زمان
اول	پوم	قوی، گنگ و طولانی تر	دریچه‌های دولختی و سهلختی	بین R و S	در نوار قلب
دوم	تاک	واضح و کوتاه‌تر	دریچه‌های سینی	اوخر T	در فاصله بین صدای اول و دوم قلب که حدوداً ۳/۰ ثانیه طول می‌کشد.

۵۰ در فاصله بین صدای اول و دوم قلب که حدوداً ۳/۰ ثانیه طول می‌کشد، دریچه‌های دولختی و سهلختی بسته و دریچه‌های سینی بازنده.

۵۱ در فاصله بین صدای دوم تا صدای اول بعدی که حدوداً ۵/۰ ثانیه طول می‌کشد، دریچه‌های دولختی و سهلختی باز و دریچه‌های سینی بسته‌اند.

۵۲ در هر چرخه قلبی، میزان فعالیت بطن‌ها بیشتر از دهلیز‌هاست؛ چون دهلیز‌ها به مدت ۱/۰ ثانیه در انقباض و ۷/۰ ثانیه در استراحت‌اند؛ در حالی که مدت زمان انقباض بطن‌ها ۳/۰ ثانیه و استراحت آن‌ها ۵/۰ ثانیه است!

تشریح قلب گوسفند

۵۳ **ویژه** برای تشخیص سطوح جلویی و عقبی قلب، علاوه بر ویژگی‌های ظاهری آن می‌توان از سرخرگ‌های ششی و آنورت استفاده کرد.

۵۴ سرخرگ ششی بعد از خروج از قلب، به دوشاخه تقسیم می‌شود و بر اساس همین ویژگی به راحتی قابل تشخیص است. سطحی از قلب که سرخرگ ششی از آن خارج می‌شود، سطح شکمی و سطح مخالف آن سطح پشتی است.

۵۵ **ویژه** روش دیگر برای تشخیص سطوح شکمی و پشتی قلب، استفاده از سرخرگ آنورت است. آنورت، قطورترین رگ متصل به قلب، است و به سطح جلویی قلب نزدیک‌تر است.

صدای طبیعی قلب



▪ صدای طبیعی قلب بر اثر بسته شدن دریچه‌های آن ایجاد می‌شوند و می‌توان آن‌ها را با چسباندن گوش یا گوشی پزشکی به سمت چپ قفسه سینه شنید.

▪ قلب در حالت طبیعی دو صدا دارد:

۱ صدای اول (پوم) که قوی، گنگ و طولانی تر است، بر اثر بسته شدن دریچه‌های دولختی و سهلختی ایجاد می‌شود.

۲ صدای دوم (تاک) که واضح و کوتاه‌تر است، بر اثر بسته شدن دریچه‌های سینی ایجاد می‌شود.

▪ در برخی بیماری‌ها، ممکن است صدای طبیعی از قلب شنیده شود؛ به‌ویژه در موارد: **۱** اختلال در ساختار دریچه‌ها **۲** بزرگ شدن قلب **۳** ناقایص مادرزادی مانند کامل نشدن دیواره میانی حفره‌های قلب.


دقت کنید: باز شدن دریچه‌ها صدا ایجاد نمی‌کند.

۴۷ صدای اول قلب در شروع سیستول بطن و صدای دوم در شروع استراحت عمومی شنیده می‌شود.

۴۸ **ویژه** همزمان با شنیدن صدای اول (شروع انقباض بطن‌ها) و دوم قلب (شروع استراحت بطن‌ها)، همه دریچه‌های قلبی به طور همزمان بسته‌اند!

۴۹ بسته شدن دریچه‌ها در شروع انقباض بطن‌ها و ایجاد صدای اول قلب ناشی از انقباض بطن‌هاست اما صدای دوم قلب، ناشی از انقباض بطنی نیست، بلکه به دلیل بازگشت خون سرخرگی است.

۵۴ برونشامه: بیرونی ترین لایه دیواره قلب است. این لایه روی خود برمی گردد و پیراشامه را به وجود می آورد. پیراشامه و برونشامه از بافت پوششی سنگفرشی و بافت پیوندی متراکم تشکیل شده‌اند. بین برونشامه و پیراشامه فضایی وجود دارد که بامایع پر شده است. این مایع ضمن محافظت از قلب به حرکت روان آن کمک می کند.



۶۴ در زیر بافت پوششی درونشامه قلب، بافت پیوندی وجود دارد که درونشامه را به لایه ماهیچهای می چسباند.

دقت کنید: پیراشامه، جزء لایه‌های سازنده دیواره قلب نیست! به عبارت دیگر دیواره قلب انسان از سه لایه درونشامه، ماهیچه قلب و برونشامه تشکیل شده است. **۶۵** سطوح درونی حفرات قلب (دهلیزها و بطن‌ها) را بافت پوششی سنگفرشی می‌پوشاند. **۶۶** **ویژه** برونشامه و پیراشامه از نظر ساختار بافتی یکسان هستند و از بافت‌های پوششی و پیوندی تشکیل شده‌اند. با این تفاوت که:

- ۱** در برونشامه، بافت پوششی در خارج و بافت پیوندی در داخل قرار دارد.
- ۲** در پیراشامه، بافت پوششی در داخل و بافت پیوندی در خارج قرار دارد.

۶۷ در لایه میانی قلب، علاوه بر یاخته‌های ماهیچهای و بافت پیوندی متراکم، رشته‌های عصبی و رگ‌های خونی نیز وجود دارند.

فلش‌بک: بافت پیوندی متراکم در مقایسه با بافت پیوندی سست:

- ۱** رشته‌های کلازن بیشتر و در نتیجه مقاومت و استحکام بیشتری دارد.
- ۲** تعداد یاخته‌های کمتری دارد و ماده زمینه‌ای آن نیز اندک است.

۶۸ در لایه ماهیچهای قلب رگ‌های خونی وجود دارند و در ساختار رگ‌های خونی، بافت پیوندی، بافت ماهیچهای و بافت پوششی وجود دارد؛ بنابراین در این لایه، بافت پوششی نیز یافت می‌شود.

۶۹ **ویژه** انواع یاخته‌هایی که در لایه میانی قلب یافت می‌شوند:

- ۱** یاخته‌های ماهیچهای قلبی
- ۲** یاخته‌های بافت پیوندی
- ۳** یاخته‌های ماهیچهای صاف (مربوط به دیواره رگ‌ها)
- ۴** یاخته‌های پوششی (مربوط به دیواره رگ‌ها)
- ۵** یاخته‌های عصبی که در تنظیم انقباض ماهیچه قلب نقش دارند.

ترتیبی رشته‌های عصبی موجود در ماهیچه قلب، مربوط به یاخته‌های عصبی حرکتی اعصاب خودمختار هستند.

۷۱ رگ‌های خونی موجود در ماهیچه قلب، انشعابات رگ‌های اکلیلی هستند.


۷۲ در دیواره همه حفرات قلبی (دهلیزها و بطن‌ها)، لایه ماهیچهای و برونشامه توسط خون روشین سرخرگ‌های اکلیلی تغذیه می‌شوند.

۷۳ دریچه‌های قلب از چین خوردن بافت پوششی درونشامه به وجود می‌آیند.

۷۴ **ویژه** پیراشامه در تماس مستقیم با پرده جنب اطراف شش‌ها قرار می‌گیرد.

سطح بیرونی پیراشامه و پرده جنب هر دو از جنس بافت پیوندی هستند.

یاخته‌های ماهیچهای قلبی



• ساختار ماهیچه قلب

۷۵ ماهیچه قلب ترکیبی از ویژگی‌های ماهیچه‌های اسکلتی و صاف را دارد و همانند ماهیچه‌های اسکلتی ظاهر مخطط و همانند ماهیچه‌های صاف انقباض غیرارادی دارد.

۵۶ **ویژه** برای تشخیص سمت چپ و راست قلب می‌توان از تفاوت ضخامت دیواره بطن‌ها استفاده کرد. دیواره بطن چپ قطورتر و در نتیجه محکم‌تر از دیواره بطن راست است.

۵۷ **ویژه** برای تشخیص سمت چپ و راست قلب می‌توان از انحنای آئورت استفاده کرد. آئورت پس از خروج از قلب، به سمت چپ خم می‌شود.



سطح شکمی قلب



سطح پشتی قلب

۵۸ در بالای قلب، سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها قابل مشاهده‌اند. این رگ‌ها را می‌توان با توجه به ویژگی‌های ظاهری آن‌ها از قبیل قطر رگ، ضخامت دیواره رگ، میزان خاصیت ارتجاعی و شکل مقطع بریده شده آن‌ها از یکدیگر تشخیص داد.

۱ **ویژگی‌های سرخرگ‌ها:** ۱- دیواره قطورتر و محکم‌تری نسبت به سیاهرگ‌ها دارند. ۲- دهانه آن‌ها در محل بریده شده به شکل گرد یا بیضی است.

۲ **ویژگی‌های سیاهرگ‌ها:** ۱- دیواره نازک‌تر و شل تری نسبت به سرخرگ‌ها دارند. ۲- دهانه آن‌ها در محل بریده شده روی هم افتاده و حالت بسته دارد.

۵۹ با وارد کردن سوند یا مداد به یکی از رگ‌های متصل به قلب و حرکت دادن آن به درون حفرات قلب می‌توان نام رگ را تشخیص داد. سرخرگ آئورت به بطن چپ، سرخرگ ششی به بطن راست، بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین به دهلیز راست و سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ راه دارند.

۶۰ با استفاده از سوند شیاردار و برش دادن دیواره سرخرگ و دیواره قلب می‌توان بخش‌های درونی قلب، دریچه‌های بین دهلیزها و بطن‌ها و سیاهرگ‌های متصل به دهلیزها را مشاهده کرد.

۶۱ سوند شیاردار را از دهانه سرخرگ ششی به بطن راست وارد کرده و سپس دیواره سرخرگ و بطن را در امتداد سوند باقیچی برش می‌دهیم. با باز کردن محل دریچه سینی سرخرگ ششی، دریچه سلختی و سطح درونی بطن راست را مشاهده کرد.

درون بطن راست برآمدگی‌های ماهیچه‌ای و طناب‌های ارتجاعی دیده می‌شوند. **۶۲** سوند شیاردار را از دهانه سرخرگ آئورت به بطن چپ وارد کرده و سپس دیواره سرخرگ و بطن را در امتداد سوند برش می‌دهیم. با باز کردن محل برش، می‌توان دریچه سینی آئورتی، دریچه دولختی و سطح درونی بطن چپ را مشاهده کرد.

در سطح درونی بطن چپ نیز برآمدگی‌های ماهیچه‌های و طناب‌های ارتجاعی را می‌توان دید. علاوه بر آن، در ابتدای سرخرگ آئورت، در بالای دریچه سینی، دو ورودی سرخرگ‌های اکلیلی قابل مشاهده‌اند.

۶۳ با عبور دادن سوند از میان دریچه‌های دولختی و سه لختی به سمت بالا و بریدن دیواره در مسیر سوند، می‌توان دیواره داخلی دهلیزها و محل اتصال سیاهرگ‌های آن‌ها را مشاهده کرد. به دهلیز چپ چهار سیاهرگ ششی و به دهلیز راست بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین و همچنین سیاهرگ اکلیلی وارد می‌شود.

«ساختار بافتی قلب»

اصل مطلب



■ قلب، اندامی ماهیچه‌ای است و دیواره آن سه لایه دارد:

۱ **درونشامه:** داخلی‌ترین لایه قلب و شمل یک لایه نازک بافت پوششی است که زیر آن، بافت پیوندی وجود دارد. درونشامه در تشکیل دریچه‌های قلب نیز شرکت می‌کند.

۲ **ماهیچه قلب:** لایه میانی و ضخیم‌ترین لایه قلب است. بیشتر از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی تشکیل شده است. بین این یاخته‌ها، بافت پیوندی متراکم نیز قرار دارد. بسیاری از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب به رشتہ‌های کلازن موجود در این بافت پیوندی متصل‌اند. بافت پیوندی متراکم باعت استحکام دریچه‌های قلبی می‌شود.

۸۱ ارتباط بین گره‌های سیتوسی - دهلیزی - بطئی از طریق رشته‌های شبکه هادی انجام می‌شود که جریان الکتریکی ایجاد شده در گره پیشاہنگ را به گره دوم منتقل می‌کند.

۸۲ پس از گره دهلیزی - بطئی، رشته‌هایی از بافت هادی که در دیواره بین دو بطن قرار دارند، به دو مسیر چپ و راست تقسیم می‌شوند و جریان الکتریکی را در بطن‌ها پخش می‌کنند. در نتیجه، پیام الکتریکی به یاخته‌های ماهیچه قلبی منتقل می‌شود و بطن‌ها به طور همزمان منقبض می‌شوند.

۸۳ شبکه هادی جزء لایه میانی قلب محسوب می‌شود و از گره اول، گره دوم و رشته‌های شبکه هادی تشکیل شده است.

۸۴ رشته‌های شبکه هادی، تارهای ماهیچه‌ای تخصص یافته برای هدایت سریع جریان الکتریکی هستند.

۸۵ **ویژه** از گره اول، چهار دسته تار خارج می‌شود. از گره دوم، فقط یک دسته تار خارج می‌شود و در بین دو بطن، دو شاخه می‌شود که تا نوک قلب ادامه پیدا می‌کنند: سپس دورتا دور بطن‌ها تا لایه عایق بین دهلیزها و بطن‌ها را احاطه و به درون دیواره بطن‌ها گسترش پیدا می‌کنند.

۸۶ سه دسته تار از رشته‌های شبکه هادی ارتباط بین گره‌های اول و دوم را برقرار می‌کنند.

۸۷ یک دسته تار، تحریکات را از گره اول به دهلیز چپ هدایت می‌کند. انتقال جریان الکتریکی در ماهیچه دهلیزها، علاوه بر تارهای شبکه هادی، از طریق صفحات بینایینی خود یاخته‌های ماهیچه قلب نیز صورت می‌گیرد.

۸۸ رشته‌های شبکه هادی در دیواره بین دو بطن، فقط یک بار منشعب و به دو شاخه تبدیل می‌شوند اما در دیواره بطن‌ها انشعابات زیادی دارند.

۸۹ **ویژه** پیام الکتریکی ابتدا به نوک بطن‌ها و سپس به بطن‌های بالایی بطن‌ها می‌رسد؛ به همین دلیل انقباض بطن‌ها از نوک آن‌ها آغاز می‌شود.

۹۰ **ویژه** نوعه انتشار پیام‌های الکتریکی تولید شده در گره پیشاہنگ:

۱ دهلیز راست: تحریک ایجاد شده در گره پیشاہنگ، از طریق صفحات بینایینی یاخته‌ها به سراسر دهلیز راست منتشر می‌شود.

۲ دهلیز چپ: ۱- دسته‌ای از رشته‌های شبکه هادی، پیام الکتریکی را به سرعت از گره پیشاہنگ به دهلیز چپ انتقال می‌دهد ۲- پیام‌ها از طریق صفحات بینایینی یاخته‌ها در دهلیز چپ منتشر می‌شوند.

۳ بطن‌ها: ۱- سه دسته از رشته‌های شبکه هادی پیام الکتریکی را به سرعت از گره پیشاہنگ به گره دهلیزی - بطئی انتقال می‌دهند. ۲- یک دسته از رشته‌های شبکه هادی پیام الکتریکی را از گره دهلیزی بطئی به دیواره بین دو بطن می‌برد. ۳- این رشته‌ها به دو مسیر چپ و راست تقسیم می‌شوند و پیام را تا نوک بطن‌ها می‌برند. ۴- انشعابات رشته‌های شبکه هادی پیام‌ها را در دیواره بطن‌ها منتشر می‌کنند.

۹۱ انتشار پیام الکتریکی در بطن‌ها از پایین به سمت بالا صورت می‌گیرد به عبارت دیگر در بطن‌های اولین بخش دریافت‌کننده پیام الکتریکی در نوک بطن‌ها آخرين بخش دریافت‌کننده پیام‌ها در مجاورت بافت عایق بین بطن‌ها و دهلیزها قرار دارد.

◆ چرخه ضربان قلب

اصل مطلب

■ قلب تقریباً در هر ثانیه یک ضربان دارد؛ البته دقیق‌تر این است که بگوییم یک چرخه طبیعی قلب $1/8$ ثانیه در نظر گرفته می‌شود. در هر چرخه ابتدا خون از طریق سیاهرگ‌ها به قلب وارد و سپس با انقباض بطئی خارج می‌شود و از طریق سرخرگ‌ها به سراسر بدن می‌رود.

■ هر چرخه یا دوره قلبی شامل ۳ مرحله زیر است:

۱ استراحت عمومی که حدوداً $4/8$ ثانیه طول می‌کشد و طی آن تمام قلب در حال استراحت است. در این مدت، خون روشن از سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ و خون تیره از بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین به دهلیز راست وارد می‌شود.

فلش بک: یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب به شکل رشته‌های منشعب هستند. بیشتر این یاخته‌ها تک‌هسته‌ای و بعضی از آن‌ها نیز دو‌هسته‌ای هستند.

۷۶ **ویژه** یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب از طریق صفحات بینایینی (درهم‌رفته) باهم ارتباط دارند. صفحات بینایینی موجب انتشار سریع پیام انقباض و استراحت بین یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب می‌شوند. در نتیجه، یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب به عنوان یک توده یاخته‌ای واحد عمل می‌کنند.

۷۷ یاخته‌های ماهیچه‌ای دهلیزها و بطن‌ها به هم اتصال ندارند چون بین آن‌ها بافت پیوندی عایق وجود دارد که مانع از انقباض همزمان دهلیزها و بطن‌ها می‌شود.

۷۸ **تکیس** انقباض ماهیچه‌ای قلب، نتیجه لغزیدن اکتین و میوزین در مجاورت یکدیگر است و برای این کار به ATP و یون کلسیم نیاز است.

۷۹ منشعب بودن یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب و وجود صفحات بینایینی از ویژگی‌های اختصاصی یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی است و در ماهیچه‌های اسکلتی و صاف دیده نمی‌شود.

۸۰ به دلیل وجود بافت عایق بین دهلیزها و بطن‌ها، انتقال پیام الکتریکی از دهلیزها به بطن‌ها فقط از طریق شبکه هادی صورت می‌گیرد و صفحات بینایینی نقشی در آن ندارند.

◆ شبکه هادی قلب

اصل مطلب

▪ بعضی از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را برای تحریک خود به خودی قلب اختصاصی کرده است. پراکنده‌گی این یاخته‌ها به صورت شبکه‌ای از رشته‌ها و گره‌ها در بین سایر یاخته‌هایی است که به مجموع آن‌ها شبکه هادی قلب می‌گویند.


▪ یاخته‌های این شبکه با دیگر یاخته‌های ماهیچه قلبی ارتباط دارند. در این شبکه، پیام‌های الکتریکی برای شروع انقباض ماهیچه قلبی ایجاد می‌شوند و به سرعت در همه قلب گسترش می‌یابند.

شبکه هادی قلب شامل اجزای زیر است:

۱ گره اول (گره سینوسی - دهلیزی): در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر متذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد. این گره بزرگ‌تر و شروع کننده پیام‌های الکتریکی است؛ به همین دلیل به آن گره پیشاہنگ یا ضربان‌ساز می‌گویند.

۲ گره دوم (دهلیزی - بطئی): در دیواره پشتی دهلیز راست و در عقب دریچه سه‌لختی قرار دارد.

۳ رشته‌های شبکه هادی: وظایف مختلفی دارند: **۱** انتقال جریان الکتریکی از گره اول به گره دوم **۲** انتقال جریان الکتریکی از گره اول به دهلیز چپ **۳** انتقال پیام الکتریکی از گره دوم به دیواره بطن‌ها



۲ انقباض بطن‌ها از پایین‌ترین قسمت آن‌ها (یعنی نوک بطن‌ها) آغاز می‌شود و به سمت بالا ادامه پیدا می‌کند.

۳ مدت بسیار کمی طول می‌کشد تا خون بتواند از بطن‌ها خارج شود؛ چون در ابتدای انقباض بطن‌ها، هنوز فشار خون سرخرگ آنورت و سرخرگ ششی بیشتر از درون بطن است.

۴ میزان فشار خون دهلیزها افزایش می‌یابد. چون در ابتدای این مرحله، دریچه‌های دولختی و سه‌لختی بسته می‌شوند و خون ورودی به دهلیزها در آن‌ها جمع می‌شود.

۵ فشار خون بطن‌ها به دلیل انقباض ماهیچه دیواره آن‌ها افزایش می‌یابد و به حداکثر مقدار خود می‌رسد.

۶ فشار خون سرخرگ‌های آنورت و ششی افزایش می‌یابد و به حداکثر مقدار خود می‌رسد. چون با انقباض بطن‌ها، خون وارد این سرخرگ‌ها می‌شود.

۷ **ویره** میزان فشاری که به دریچه‌های سینی وارد می‌شود از بین دریچه‌های دهلیزی بطنی از فشاری است که به دریچه‌های دولختی و سه‌لختی وارد می‌شود. بیشتر نیز میزان فشار واردشده به دریچه دولختی بیشتر از دریچه سه‌لختی است.


۸ **ویره** قدرت انقباضی بطن چپ از بطن راست بیشتر است؛ به همین دلیل، فشار خون موجود در سرخرگ آنورت از سرخرگ ششی بیشتر است.

۹ **ویره** بیشترین حجم خون بطن‌ها، همزمان با پایان انقباض دهلیزهاست.

۱۰ بیشترین مقدار فشار خون هر یک از حفرات قلبی، مربوط به هنگام انقباض آن‌هاست. به عنوان مثال بیشترین فشار خون بطن چپ مربوط به مرحله انقباض بطنی است.

۱۱ تذکر مهم: بیشترین مقدار فشار حفرات قلبی، هنگامی نیست که بیشترین مقدار خون را در خود جای داده‌اند بلکه هنگامی است که بیشترین شدت انقباض را دارند. به عنوان مثال، حداکثر مقدار خونی که در بطن جمع می‌شود، مربوط به انتهای انقباض دهلیزی است. اما در این زمان هنوز فشار خون بطن‌ها به حداکثر نرسیده و به همین دلیل هنوز خونی از بطن خارج نمی‌شود.

۱۲ در دوره قلبی، به مدت ۵/۰ ثانیه (انقباض دهلیز و استراحت عمومی)، وضعیت دریچه‌های قلبی هیچ تغییری نمی‌کند! در این مدت، دریچه‌های دهلیزی بطنی باز و دریچه‌های سینی بسته‌اند.



۱۳ **ویره** در شروع انقباض بطنی، دریچه‌های سینی بسته‌اند و در زمان کوتاهی در اثر برخورد خون، دریچه‌های دهلیزی بطنی نیز بسته می‌شوند و می‌توان گفت که در این لحظه، هر چهار دریچه قلبی بسته‌اند و با اندکی فاصله، دریچه‌های سینی باز می‌شوند.

۱۴ در مرحله انتهایی انقباض بطن‌ها، دریچه‌های سینی بسته می‌شوند و با توجه به این که از قبل، دریچه‌های دهلیزی بطنی نیز بسته شده‌اند، می‌توان گفت که در این لحظه، هر چهار دریچه قلبی به طور همزمان بسته‌اند. اندکی پس از این لحظه، یعنی با شروع استراحت عمومی، دریچه‌های دهلیزی بطنی باز می‌شوند.

۱۵ انقباض دهلیزی که حدوداً ۱/۰ ثانیه طول می‌کشد و طی آن، خون باقی‌مانده در دهلیزها وارد بطن‌ها می‌شود و بطن‌ها به طور کامل با خون پر می‌شوند. انقباض دهلیزی بسیار زودگذر است.

۱۶ انقباض بطنی که حدوداً ۳/۰ ثانیه طول می‌کشد و طی آن با انقباض بطن‌ها، خون روشن از بطن چپ وارد سرخرگ آنورت می‌شود و به سراسر بدن می‌رود و خون تیره از بطن راست وارد سرخرگ ششی می‌شود و به سوی شش‌ها می‌رود.

۱۷ انقباض ماهیچه‌های قلب سیستول و استراحت ماهیچه‌های قلب دیاستول نامیده می‌شود.

۹۲ **ویره** در چرخه ضربان قلب، سه عامل باعث می‌شوند تا بطن‌ها دیرتر از دهلیزها منقبض شوند:

۱ وجود بافت عایق بین دهلیزها و بطن‌ها

۲ وقفه زمانی در انتشار تحریکات از گره دوم به رشته‌های شبکه هادی

۳ وجود گره ایجاد‌کننده تکانه‌های قلبی در دهلیز راست

۹۳ خروج خون از بطن‌ها فقط هنگام سیستول (انقباض) آن‌ها صورت می‌گیرد اما خروج خون از دهلیزها هم موقع انقباض و هم موقع استراحت آن‌ها صورت می‌گیرد! به عبارت دیگر مدت زمان خروج خون از دهلیزها بیشتر از مدت زمان خروج خون از بطن‌هاست.

۹۴ عمدۀ خونی که از دهلیزها به بطن‌ها می‌ریزد، مربوط به مرحله استراحت عمومی است. این عمل بدون مصرف انرژی زیستی انجام می‌شود. فقط مقدار کمی خون هنگام انقباض دهلیزها با مصرف انرژی زیستی به بطن می‌ریزد. در حالی که خروج خون از بطن، کلانیازمند انقباض ماهیچه قلب و مصرف انرژی زیستی است.

۹۵ **ویره** در استراحت عمومی، خون ورودی به دهلیزها بیشتر از خون خروجی از آن‌هاست! به همین دلیل، مقداری خون در دهلیزها می‌ماند و خروج آن نیازمند انقباض دهلیزهاست.

۹۶ در مرحله استراحت عمومی:

۱ به مدت ۱/۴ ثانیه تمام ماهیچه‌های قلبی در حال استراحت‌اند.

۲ خون تیره بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین به دهلیز راست و خون روشن سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ می‌ریزد.

۳ اواخر استراحت عمومی، فعالیت تارهای ماهیچه‌های شبکه هادی (گره اول)، آغاز می‌شود.

۴ در استراحت عمومی، خون به دهلیزها هم وارد و هم از آن‌ها خارج می‌شود.

۵ فشار خون سرخرگ‌های آنورت و ششی کاهش می‌یابد.

۶ فشار خون بطن‌ها کمترین مقدار خود را دارد.

دقت کنید: دو عامل اصلی در تعیین فشار خون حفرات قلب نقش دارند: ۱) حجم خون ۲) نیروی انقباضی دیواره حفره. از بین این دو عامل، تأثیر انقباض دیواره حفره قلبی خیلی بیشتر از حجم خون است.

۹۷ **ویره** در مرحله انقباض دهلیزی:

۱ با پایان انقباض دهلیزها، حجم خون دهلیزی به کمترین و حجم خون بطن‌ها به بیشترین مقدار خود می‌رسد. در این زمان، بطن‌ها به طور کامل با خون پر می‌شوند.

۲ فشار خون سرخرگ‌های آنورت و ششی تغییری نمی‌کند؛ چون خون وارد آن‌ها نمی‌شود.

۹۸ هنگام انقباض دهلیزها، وضعیت هیچ‌یک از دریچه‌های قلبی تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر هیچ‌یک از این دریچه‌ها باز یا بسته نمی‌شوند. یعنی در هر وضعیتی که هنگام استراحت عمومی قرار داشتند، به همان وضعیت باقی می‌مانند. یعنی دریچه‌های دولختی و سه‌لختی باز و دریچه‌های سینی بسته‌اند.

۹۹ **ویره** در مرحله انقباض بطنی:

۱ به مدت ۱/۳ ثانیه بطن‌ها منقبض می‌شوند. خون روشن بطن چپ وارد سرخرگ آنورت می‌شود و به سراسر بدن می‌رود و خون تیره بطن راست وارد سرخرگ ششی می‌شود و به سوی شش‌ها می‌رود.


▪ نوار قلب شامل سه موج است:

۱ فعالیت الکتریکی دهلیزها به شکل موج P ثبت می‌شود و اندکی پس از شروع این موج، دهلیزها به انقباض درمی‌آیند.

۲ فعالیت الکتریکی بطن‌ها به شکل موج QRS ثبت می‌شود و اندکی پس از شروع این موج، بطن‌ها به انقباض درمی‌آیند.

۳ موج T اندکی پیش از پایان انقباض بطن‌ها و بازگشت آن‌ها به حالت استراحت ثبت می‌شود. به عبارت دیگر اندکی پس از شروع این موج، انقباض بطن‌ها به پایان می‌رسد.

▪ بررسی تغییراتی که در نوار قلب رخ می‌دهد، می‌تواند به متخصصان در تشخیص بیماری‌های قلبی کمک کند.



۱۱۵ انقباض دهلیزها و بطن‌ها اندکی پس از شروع فعالیت الکتریکی آن‌هاست.

به عبارت دیگر دهلیزها اندکی پس از شروع موج P و بطن‌ها اندکی پس از شروع موج QRS منقبض می‌شود.

ویژه در منحنی نوار قلب:

۱ انقباض دهلیزها کمی پس از شروع موج P آغاز می‌شود و تا کمی پس از شروع موج QRS ادامه دارد.

۲ انقباض بطن‌ها کمی پس از شروع موج QRS آغاز می‌شود و تا کمی قبل از پایان موج T ادامه دارد.

۳ استراحت عمومی کمی قبل از پایان موج T آغاز می‌شود و تا کمی پس از شروع موج P ادامه دارد.

۱۱۷ از اواسط موج P تا اواسط موج QRS مربوط به انقباض دهلیزها است و حدود ۱/۰ ثانیه طول می‌کشد.

۱۱۸ از اواسط موج QRS تا اواسط موج T مربوط به انقباض بطن‌ها است و حدود ۱/۳ ثانیه طول می‌کشد.

۱۱۹ از اواسط موج T تا اواسط موج P مربوط به انقباض استراحت عمومی است و حدود ۱/۴ ثانیه طول می‌کشد.

۱۲۰ موج P در اثر پیام الکتریکی ایجادشده در گره سینوسی-دهلیزی و موج QRS در اثر تحریک گره دهلیزی-بطنی ثبت می‌شود.

۱۲۱ بافت‌های مختلف بدن همانند ماهیچه قلب، پیام‌های الکتریکی را از خود عبور می‌دهند. به همین دلیل می‌توان نوار قلب را از سطح پوست ثبت کرد.

۱۲۲ پیام الکتریکی، کمی قبل از موج P توسط گره پیشاپنگ تولید و در ابتدای موج P منتشر می‌شود که نتیجه آن تشکیل موج P است.

۱۲۳ در پایان موج P پیام الکتریکی به گره دهلیزی - بطنی می‌رسد، اما مدتی طول می‌کشد تا این پیام به دیواره بطن‌ها منتشر شود. همین وقفه باعث می‌شود تا بطن‌ها دیرتر از دهلیزها به انقباض درآیند.

۱۲۴ **ویژه** اندکی پس از شروع انقباض بطن‌ها، دریچه‌های دولختی و سه‌لغزی بسته می‌شوند؛ بنابراین صدای اول قلب که ناشی از بسته شدن دریچه‌های دولختی و سه‌لغزی است، قبل از پایان موج QRS شنیده می‌شود.

۱۲۵ اندکی پس از پایان انقباض بطن‌ها (در شروع استراحت عمومی)، دریچه‌های سینی بسته می‌شوند؛ بنابراین صدای دوم قلب که ناشی از بسته شدن دریچه‌های سینی است، قبل از پایان موج T شنیده می‌شود.

جمع‌بندی چرخه ضربان قلب



مرحله	استراحت عمومی	انقباض دهلیزها	انقباض بطن‌ها
مدت زمان	۴/۰ ثانیه	۱/۰ ثانیه	۳/۰ ثانیه
وضعیت دهلیزها	دیاستول	دیاستول	دیاستول
وضعیت بطن‌ها	دیاستول	دیاستول	دیاستول
دربیچه‌های دهلیزی بطنی	باز	باز	باز
دربیچه‌های سینی	بسته	باز	باز
حجم خون دهلیزها	در حال افزایش	در حال افزایش	در حال کاهش
فشار خون دهلیزها	در حال افزایش	در حال افزایش	در حال افزایش
حجم خون بطن‌ها	در حال افزایش	در حال افزایش	در حال کاهش
فشار خون بطن‌ها	حداقل مقدار خود	در حال افزایش	در حال کاهش
فشار خون سرخرگ‌های آنورت و ششی	حداکثر مقدار خود	بدون تغییر	در حال کاهش

◀ برون ده قلبی

۱۰۷ مقدار خونی که در هر انقباض بطنی از یک بطن خارج می‌شود را حجم ضربه‌ای می‌گویند.

۱۰۸ برون ده قلبی حاصل ضرب حجم ضربه‌ای در تعداد ضربان قلب در دقیقه است؛ بنابراین برون ده قلب با حجم ضربه‌ای و تعداد ضربان‌های قلب رابطه مستقیم دارد.

دقت کنید: حجم ضربه‌ای و برون ده قلبی نشان‌دهنده خون خارج شده از یک بطن است. بدینهای است که مقدار خون خارج شده از قلب در هر ضربان دو برابر حجم ضربه‌ای و خون خارج شده از قلب در مدت یک دقیقه دو برابر برون ده قلبی است.

۱۰۹ میانگین برون ده قلبی در بزرگسالان در حال استراحت، حدود ۵ لیتر در دقیقه است. در هر دقیقه، حدود ۱۰ لیتر خون از قلب بزرگسالان خارج می‌شود. چون برون ده قلبی برای یک بطن محاسبه می‌شود.

۱۱۰ **تکیبی** با افزایش ترشح هورمون‌های تیروئیدی، سوخت‌وساز بدن افزایش می‌یابد و در نتیجه، یاخته‌های بدن به اکسیزن و گلوکز بیشتری نیاز دارند. در این شرایط، ضربان قلب نیز افزایش می‌یابد تا با افزایش برون ده قلب، خون بیشتری به سوی اندام‌ها بفرستد و نیاز آن‌ها را تأمین کند.

۱۱۱ وجود نقص در هر یک از دریچه‌های قلب، سبب کاهش برون ده قلب می‌شود و در نتیجه، بخشی از ارزی مصرف شده توسط قلب، هدر می‌رود.

۱۱۲ برون ده قلبی متناسب با سطح فعالیت بدن تغییر می‌کند.

۱۱۳ برخی عوامل مؤثر در برون ده قلبی:

۱ سوخت‌وساز پایه بدن **۲** مقدار فعالیت بدن **۳** سن **۴** اندازه بدن **۱۱۴** با افزایش میزان فعالیت بدن (متل ورزش)، ضربان قلب افزایش می‌یابد و در نتیجه، برون ده قلبی نیز افزایش می‌یابد.

◀ نوار قلب

اصل مطلب



▪ یاخته‌های ماهیچه قلبی در هنگام چرخه ضربان قلب، فعالیت الکتریکی را نشان می‌دهند. جریان الکتریکی حاصل از فعالیت قلب را می‌توان در سطح پوست دریافت و به صورت نوار قلب ثبت کرد.



فصل ۴: گردش مواد در بدن

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

قلب

گفتار
اول

آموزش
+ 40
آزمون
+ 40

۱ مشاوره: مفهومی ترین مبحث این گفتار، نوار قلبی؛ پس حتماً برای پادگیری این بخش باید وقت کافی بذارین؛ چون اولاً اهمیتش زیاده، دوماً شغل آیندتوها تابع و مشتق نیست که بعداً توی مطب‌تون بهش نیاز نداشته باشین!

- ب) ضخامت دیواره و گنجایش بطن چپ بیشتر از بطن راست است.
۵ در هر دوره کار قلبی، گردش خون عمومی پس از گردش ششی انجام می‌شود.

۴

۳

قلب و رگ‌های متصل به آن

کدام گزینه درست است؟

- ۱) گردش عمومی خون از آئورت آغاز و به دهلیز راست ختم می‌شود.
۲) اولین رگ خونی که لغف به آن وارد می‌شود، محتویات خود را به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.
۳) دریچه سینی آئورتی برخلاف دریچه میترال، از بازگشت خون روش به سرخرگ جلوگیری می‌کند.
۴) اولین حفره قلبی که در تماس با خون دریافت شده از روده بزرگ قرار می‌گیرد، با دهلیز راست ارتباط دارد.

چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

- الف) در محل اتصال بعضی سیاهرگ‌ها به قلب، دریچه وجود ندارد.
ج) یاخته‌های شبکه هادی قلب، در دیواره همه حفرات آن یافت می‌شوند.

۱) ۲

کدام گزینه در ارتباط با سرخرگ آئورت درست است؟

- ۱) فشار خون موجود در ابتدای آئورت و سرخرگ ششی برابر است.
۲) سرخرگ ششی چپ فاقد دریچه است و از زیر قوس آئورت عبور می‌کند.
۳) قبل از رسیدن آئورت به سطح پشتی قلب، سه سرخرگ از آن منشعب می‌شوند.
۴) بخشی از خون واردشده به آئورت اکسیرن و مواد غذایی ماهیچه قلب را تأمین می‌کند.

چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

- «از بین رگ‌های متصل به حفرات قلب انسان، به طور طبیعی خون»
الف) چهار سیاهرگ - پراکسیزن را به حفرات بالایی قلب وارد می‌کنند.
ج) سه سیاهرگ - دارای بیکربنات زیاد را به دهلیزها وارد می‌کنند.

۱) ۲

کدام گزینه نادرست است؟

- ۱) در انسان، به طور طبیعی تعداد دریچه‌های قلب دو برابر تعداد سرخرگ‌های اکلیلی منشعب شده از آئورت است.
۲) مقدار خون روشی که وارد بطن چپ می‌شود، بیشتر از مقدار خون تبره ورودی به بطن راست است.
۳) دهلیز راست، اولین حفره قلبی است که ترکیبات جذب شده توسط مویرگ‌های لغفی وارد آن می‌شوند.
۴) گلوکز مورد نیاز یاخته‌های ماهیچه‌ای بطن راست، توسط انشعبات رگ خارج شده از بطن چپ تأمین می‌شود.

آزمون
+ 60
آزمون
+ 60

(ترکیبیں با سایر فصل‌ها)

- ب) سیاهرگ ششی از لوب‌های شش راست بیشتر
۵ سرخرگ منشعب از قوس آئورت از سیاهرگ‌های ششی کمتر

۴

۳

چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در یک انسان سالم، تعداد است.»

- الف) سیاهرگ اکلیلی ورودی به دهلیز راست از نایزه‌های اصلی گفتار
ج) سرخرگ‌های اکلیلی منشعب از آئورت با سرخرگ‌های ششی برابر

۱) ۲

آزمون
+ 80
آزمون
+ 80

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

- «به حفرات یک نیعه قلب انسان، پنج رگ بزرگ راه دارند. در این نیعه قلب خونی وارد می‌شود که تباہلات گازی را در شش‌ها انجام داده است.
● خون پراکسیزن دریافت و به مسیر گردش عمومی فرستاده می‌شود.
● محل قرار گرفتن دریچه بین دهلیز و بطن بالاتر از نیعه دیگر است.
● طناب‌های ارجاعی مانع از باز شدن دریچه‌های قلب به سمت دهلیز می‌شوند.

۱) ۲

دیرچه‌ها و صدای قلب

چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«بعضی از دریچه‌های موجود در دستگاه گردش خون انسان،»

الف) در ساختار خود بافت ماهیچه‌ای ندارند.

ج) بدون مصرف انرژی زیستی و به صورت یک طرفه باز می‌شوند.


۱) ۲

آزمون
+ 40
آزمون
+ 40

- ب) مانع از حرکت خون در جهت جاذبه زمین نمی‌شوند.
۵ به دلیل وجود اختلاف فشار در خون دو سمت خود باز و بسته می‌شوند.

۴

۳



۵۲۰ با توجه به شکل مقابل که قلب انسان را نشان می‌دهد، موره شعاره

- (۱) حفره‌ای است که در محل ورود خون از رگ‌ها به آن دریچه وجود ندارد.
- (۲) دریچه‌ای است که مانع از بازگشت خون کماکسین به قلب می‌شود.
- (۳) رگی است که حرکت خون در طول آن توسط دریچه‌های تسهیل می‌شود.
- (۴) حفره‌ای است که خون موجود در آن از طریق رگ‌های ویژه‌ای به ماهیچه قلب می‌رسد.

۵۲۱ کدام گزینه درست است؟

- (۱) برای باز و بسته شدن هر دریچه قلبی، تفاوت فشار در دو سمت آن الزامی است.
- (۲) در شروع سیستول بطنی، فشار خون در دو سمت برخی دریچه‌های قلبی متغیر است.
- (۳) در هر سیستول بطنی، مقدار خون وارد شده به سرخرگ آورت بیشتر از سرخرگ ششی است.
- (۴) هم‌زمان با رسیدن پیام‌های الکتریکی به گره دوم، دریچه‌های دهلیزی - بطنی بسته می‌شوند.

۵۲۲ در یک فرد سالم، فقط هنگامی که دریچه‌های بین دهلیزها و بطن‌ها

- (۱) بازند، خون از طریق بطن‌ها وارد دهلیزها می‌شود.
- (۴) بسته‌اند، خون وارد حفرات بزرگ قلب نمی‌شود.

۵۲۳ در یک دوره کار طبیعی قلب انسان، پلافالسله از شنیدن صدای

- (۲) قبل - قوی و گنج، انتشار موج تحریک در بطن‌ها پایان می‌یابد.
- (۴) بعد - کوتاه و واضح، ورود خون روشن به بطن چپ با مانع موافق می‌شود.

۵۲۴ کدام گزینه در ارتباط با عملکرد دریچه‌های قلبی انسان سالم درست است؟

- (۱) کمی بعد از شنیدن صدای دوم قلب، دریچه‌های بین دهلیزها و بطن‌ها باز می‌شوند.
- (۲) هم‌زمان با شروع انتشار پیام استراحت بطن‌ها، دریچه سینی آورت بسته می‌شود.
- (۳) کمی قبل از شنیدن صدای اول قلب، فشار خون درون بطن‌ها به حداقل مقدار خود می‌رسد.
- (۴) هم‌زمان با ورود پیام الکتریکی به گره دهلیزی - بطنی، دریچه سینی سرخرگ ششی بسته می‌شود.

۵۲۵ کدام گزینه در ارتباط با قلب انسان درست است؟

- (۱) بسته‌شدن هر یک از رگ‌های اکلیلی آن منجر به سکته قلبی می‌شود.
- (۲) سرخرگ‌های تنفسی کنده همه حفرات آن، از یک رگ اصلی منشأ می‌گیرند.
- (۳) در هر لایه آن، فقط بعضی یاخته‌ها برای تحریک خود به خود اختصاصی شده‌اند.
- (۴) بین بطن‌های انسان، بافتی وجود دارد که مانع از انتقال جریان الکتریکی بین آن‌ها می‌شود.

۵۲۶ کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

با توجه به شکل مقابل، خون از دریچه عبور می‌کند.

- (۱) تیره موجود در قلب، برای رفتن به محل تبادلات گازی - b
- (۲) حاوی کلسترول جذب شده در روده، برای ورود به قلب، ابتدا - a
- (۳) روشن حاصل از گردش خون ششی، پس از ورود به قلب، ابتدا - a
- (۴) تیره سیاهرگ اکلیلی برای ورود به یکی از حفرات بزرگ قلبی، ابتدا - d

۵۲۷ کدام گزینه، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

در مرحله‌ای از چرخه ضربان قلب که در آن دریچه است، می‌یابد.

- (۲) سینی آورتی باز - فشار خون بطن‌ها به طور پیوسته افزایش
- (۴) میترال برخلاف دریچه سینی باز - حجم خون بطن‌ها به طور پیوسته افزایش

۵۲۸ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می‌کند؟


در شکل مقابل که مربوط به دریچه‌های مرتبط با قلب است، دریچه‌ای که با شماره مشخص شده است،

۱) ۳- برخلاف دریچه شماره ۴، هنگام ثبت موج P نوار قلب بسته است.

۲) همانند دریچه شماره ۳، به دنبال افزایش فشار خون بطن چپ، باز می‌شود.

۳) ۱- برخلاف دریچه شماره ۲، توسط رشته‌هایی به دیواره بطن چپ متصل شده است.

۴) همانند دریچه شماره ۱، در تماس با خون دارای مقادیر بالایی از کربن دی‌اکسید است.



تشريح قلب گوسفنده و ساختار بافتی قلب انسان

۵۲۹ در قلب گوسفند،

(۱) سرخرگ‌های کرونری در سطوح پشتی و شکمی دیده می‌شوند.

(۳) دو دریچه سه قسمتی می‌توان یافت که قادر بافت ماهیچه‌ای هستند.

۵۳۰ در تشريح قلب گوسفند، معمولاً برای مشاهده بهتر ابتدا لازم است دیواره برش داده شود.

(۱) دریچه میترال - یکی از سیاهرگ‌های ششی

(۲) طناب‌های ارجاعی دیواره بطن چپ - سرخرگ آورت

(۴) سطح درونی دهلیز راست - یکی از بزرگ سیاهرگ‌های زیرین پا زیرین

آموخته

+ 40

%

۶۳۱ چند مورد در رابطه با تشریح قلب گوستنده نادرست است؟

- ب) تعداد رگ‌های وارد شده به قلب در نیمه چپ بیشتر از نیمه راست است.
- د) سیاهرگ‌های اکلیلی در سطح پشتی قلب به دهلیز راست وارد می‌شوند.

۴

۳

۲

۱

۶۳۲ کدام گزینه درباره تشریح قلب گوستنده نادرست است؟

- ۱) در بررسی سطح شکمی قلب، سرخرگ ششی جلوتر از بزرگ سیاهرگ زیرین قرار دارد.
- ۲) هنگام مشاهده سطح پشتی قلب، سیاهرگ ششی همانند سرخرگ اکلیلی قابل مشاهده است.
- ۳) قبل از بریدن دیواره دهلیزها به منظور مشاهده درون آن‌ها، ابتدا باید چربی‌های روی قلب را جدا کنیم.
- ۴) هیچ یک از طناب‌های ارجاعی مربوط به دریچه‌های دولختی و سملختی به دیواره دهلیزها اتصال ندارند.

۶۳۳ کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

- ۵) قلب انسان، بافتی وجود دارد که
- ۱) لایه ماهیچه‌ای - یاخته‌های آن منشعباند و بسیاری از آن‌ها به رشته‌های پروتئینی متصل‌اند.
 - ۲) پیراشامه - رشته‌های کلازن فراوان و ماده زمینه‌ای اندک دارد که به بافت سنگفرشی متصل است.
 - ۳) درون‌شامه - یاخته‌های آن از یک طرف با خون و از طرف دیگر در اتصال با غشاء پایه قرار دارند.
 - ۴) برون‌شامه - فضای بین یاخته‌ای اندک دارد و به طور مستقیم به یاخته‌های ماهیچه‌ای متصل است.

۶۳۴ چند مورد، در ارتباط با یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب انسان، درست است؟

- ۱) صفحات بینایی در انتقال جریان الکتریکی بین دو دهلیز نقش دارند.
- ۲) بعضی از یاخته‌های ماهیچه‌ای در اتصال با بافت پیوندی متراکم قرار دارند.
- ۳) هر یاخته‌ای قادرند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند.
- ۴) برون‌شامه - فضای بین یاخته‌ای اندک دارد و به طور مستقیم به یاخته‌های ماهیچه‌ای متصل است.

۴) ۳) ۲) ۱)

۶۳۵ کدام گزینه، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در ساختار قلب انسان، هر لایه‌ای که»

- ۱) در تشکیل دریچه‌های قلب شرکت دارد، علاوه بر بافت پوششی، دارای بافت پیوندی متراکم است.
- ۲) در تماس مستقیم با مایع محافظت‌کننده از قلب قرار دارد، بیرونی ترین لایه دیواره قلب محسوب می‌شود.
- ۳) گروهی از یاخته‌های آن توسط صفحات در هم رفته به هم متصل‌اند، توسط انشعاباتی از آنورت تغذیه می‌شود.
- ۴) سطح درونی حفرات بزرگ را می‌پوشاند، در تماس با لایه‌ای قرار دارد که در مناطق مختلف، ضخامت یکسانی دارد.

۶۳۶ کدام گزینه، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«دریچه سینی آنورتی از چین خوردن بافتی حاصل می‌شود که»

- ۱) بسیاری از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب در اتصال مستقیم با آن قرار دارند.
- ۲) در ساختار آن، رشته‌های کلازن فراوان و ماده زمینه‌ای اندک وجود دارد.
- ۳) با تولید و ترشح نوعی مایع، نقش مهمی در محافظت از قلب بر عهده دارد.
- ۴) یاخته‌های آن در اتصال با انواعی از پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها قرار دارند.

۶۳۷ در ارتباط با قلب انسان سالم و بالغ، کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

- ۱) وجود نوعی بافت غیرپیوندی موجب انقباض همزمان حفرات بزرگ آن می‌شود.
- ۲) هر یاخته ماهیچه‌ای آن، فقط در صورت دریافت پیام عصبی به انقباض درمی‌آید.
- ۳) وجود نوعی بافت پیوندی مانع از انتشار جریان الکتریکی از دهلیزها به بطن‌های ماهیچه‌ای آن است.
- ۴) هر یک از یاخته‌های دیواره آن که چندین هسته دارد، قطعاً جزء لایه ماهیچه‌ای آن است.

۶۳۸ چند مورد، در ارتباط با قلب انسان سالم و بالغ نادرست است؟

الف) بافت پوششی برخلاف بافت پیوندی در ساختار دریچه‌های قلب شرکت می‌کند.

ب) در پیراشامه همانند درون‌شامه، نوعی بافت پیوندی با رشته‌های کلازن فراوان دارد.

ج) در لایه ماهیچه‌ای برخلاف لایه‌های دیگر، بافت پیوندی با ماده زمینه‌ای اندک یافت می‌شود.

د) درون‌شامه همانند پیراشامه در اتصال مستقیم با قطورترین لایه دیواره آن قرار گرفته است.

۱) ۳) ۲) ۱)


۶۳۹ با توجه به شکل مقابل که بخشی از دیواره قلب انسان را نشان می‌دهد، در بخش

۱) ب) برخلاف c بافتی با ماده زمینه‌ای اندک می‌توان یافت.

۲) a) برخلاف d بافتی با فضای بین یاخته‌ای اندک می‌توان یافت.

۳) d) همانند b) یاخته‌های پوششی در تماس مستقیم با مایع قرار دارند.

۴) c) همانند a) بعضی یاخته‌های پوششی در تماس با بافت پیوندی قرار دارند.



شبکه هادی قلب

۶۴۰ معمولاً در قلب انسان، به دلیل رخ می‌دهد.

- ۱) عدم انتقال پیام الکتریکی بین دو بطن - وجود نوعی بافت پیوندی عایق
- ۲) انتقال پیام الکتریکی از دهلیز چپ به دهلیز راست - وجود دسته‌ای از تارهای اختصاصی
- ۳) ارسال سریع پیام الکتریکی از گره اول به گره دوم - استفاده همزمان از چهار دسته تار
- ۴) عدم انقباض همزمان دهلیزها و بطن‌ها - تأخیر در ارسال پیام الکتریکی از گره دوم به بطن‌ها



۶۴۱ در شبکه هادی قلب انسان، گره

- (۱) دهلیزی - بطنی در عدم انقباض همزمان دهلیزها و بطنها نقش دارد.
- (۲) پیشاہنگ، در تماس مستقیم با خون تیره ورودی از بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد.
- (۳) سینوسی - دهلیزی، آغاز کننده پیام‌های الکتریکی است و در مجاورت دریچه سه‌لختی قرار دارد.
- (۴) ضربان‌ساز، فقط در پاسخ به اعصاب آسمیمیک، پیام‌های الکتریکی را ایجاد و در قلب منتشر می‌کند.

۶۴۲ چند مورد، در ارتباط با شبکه هادی قلب انسان درست است؟

- الف) هر دسته تار موجود در دهلیزها، با هر دو گره شبکه هادی اتصال دارد.
- ب) گره پیشاہنگ برخلاف گره دهلیزی - بطنی در دیواره پشتی دهلیز راست قرار دارد.
- ج) گره کوچک‌تر در مجاورت دریچه‌ای قرار دارد که در تولید صدای اول قلب مؤثر است.
- د) گره دهلیزی - بطنی، پیام دریافت شده از گره اول را بلافصله به دیواره بین بطن‌ها منتقل می‌کند.

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۴

۶۴۳ کدام گزینه درست است؟

- (۱) انقباض بطن‌ها از دورترین نقطه نسبت به گره دهلیزی - بطنی آغاز می‌شود.
- (۲) هنگام انقباض دهلیزها، طناب‌های ارجاعی در کشیده‌ترین حالت خود قرار دارند.
- (۳) دریچه‌ای که در جلوی گره دهلیزی - بطنی قرار دارد، هنگام انقباض دهلیزها باز می‌شود.
- (۴) نزدیک‌ترین دریچه به پخش انتهایی تارهای هادی ورودی به دهلیز چپ، مانع از بازگشت خون روشن به بطن می‌شود.

۶۴۴ گره دهلیزی - بطنی، گره سینوسی - دهلیزی

- ۱) برخلاف - با دسته تارهای بین بطنی ارتباط ندارد.
- ۲) همانند - با دسته‌هایی از تارهای ماهیچه‌ای خاص در ارتباط است.

۶۴۵ کدام گزینه در مورد شبکه هادی قلب انسان درست است؟

- (۱) چهار دسته تار تخصص یافته، بین گرههای شبکه هادی ارتباط برقرار می‌کنند.
- (۲) گره اول همانند گره دوم با چهار دسته تار شبکه هادی ارتباط مستقیم دارد.
- (۳) از گره دهلیزی - بطنی، دو دسته تار خارج می‌شوند و به درون بطن‌ها گسترش می‌یابند.
- (۴) دسته تارهایی که در دیواره بین دو بطن قرار دارند، انشعابات خود را به درون بطن‌ها می‌فرستند.

۶۴۶ کدام گزینه در ارتباط با انتشار جریان الکتریکی در دیواره قلب انسان سالم و بالغ درست است؟

- (۱) بلافصله پس از بسته شدن دریچه‌های دولختی و سه‌لختی، جریان الکتریکی در دیواره بین دو بطن منتشر می‌شود.
- (۲) یک دسته از تارهای شبکه‌های هادی، جریان الکتریکی را از گره دهلیزی - بطنی به نوک بطن‌ها انتقال می‌دهد.
- (۳) بعضی از تارهای ماهیچه‌ای قلبی در انتقال جریان الکتریکی از گره دوم به دیواره بطن‌ها نقش دارند.
- (۴) گره دهلیزی - بطنی برخلاف گره ضربان‌ساز در دیواره پشتی دهلیز راست قرار گرفته است.

⑨ چرخه ضربان قلب، بروند و نوار قلب

۶۴۷ کدام گزینه درست است؟

- ۱) دریچه‌های سینی آئورتی و دولختی ساختار مشابهی دارند.
- ۲) دریچه سینی کوتاهی از مدت زمان بودن آن است.
- ۳) مدت زمان باز بودن دریچه سه‌لختی بیشتر از مدت زمان بسته بودن آن است.
- ۴) در مدت زمان کوتاهی از شروع استراحت عمومی، همه دریچه‌های قلب باز هستند.

۶۴۸ کدام گزینه درباره چرخه ضربان قلب انسان سالم، نادرست است؟

- (۱) دیاستول و سیستول متنابض قلب، چرخه قلبی تامیده می‌شود.
- (۲) قلب یک فرد سالم و بالغ در هر دقیقه، به طور متوسط ۶۰ ضربان دارد.
- (۳) مدت زمان ورود خون به دهلیزها بیشتر از مدت زمان ورود خون به بطن‌هاست.
- (۴) هنگام شروع موج T در نوار قلب، دریچه‌های دهلیزی - بطنی بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.

۶۴۹ همزمان با در نوار قلب یک فرد سالم و بالغ، قلب در وضعیت قرار دارند.

- ۱) پایان موج T - همه حفرات - دیاستول
- ۲) پایان موج QRS - همه حفرات - سیستول
- ۳) شروع موج P - فقط حفرات کوچک - دیاستول
- ۴) شروع موج QRS - فقط بزرگ‌ترین حفرات - سیستول

۶۵۰ چند مورد، در ارتباط با صدایهای قلب انسان درست است؟

- صدایی که در شروع دیاستول بطن‌ها شنیده می‌شود، گنگ و قوی است.
- بلافصله پس از استراحت عمومی قلب، صدای کوتاه و واضح قلبی را می‌توان شنید.
- در دوره قلبی، صدای تاک بر اثر بسته شدن کوچک‌ترین دریچه‌های قلبی ایجاد می‌شود.
- بلافصله پس از این که بطن‌ها به طور کامل با خون پر می‌شوند، صدای اول قلب را می‌توان شنید.

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۴

۶۵۱ کدام گزینه، درباره دریچه‌های قلب انسان درست است؟

- (۱) وجود بافت پیوندی به استحکام دریچه سینی سرخرگ ششی کمک می‌کند.
- (۲) دریچه سینی آئورتی برخلاف دریچه دولختی هنگام سیستول بطنی بسته می‌شود.
- (۳) تنها عامل مؤثر در باز و بسته شدن دریچه سینی، تفاوت فشار خون در دو سمت آن است.
- (۴) دریچه سه‌لختی همانند دریچه سینی سرخرگ ششی می‌تواند مانع ورود خون به بطن شود.

۵۵۲ در بررسی صدای قلب یک فرد سالم با گوشی پزشکی، در هر چرخه قلبی، صدای شنیده می‌شود.

- (۱) ناشی از جریان خون آنورت به سوی قلب، دیرتر از صدای دیگر
- (۴) باز شدن دریچه‌های سینی، در شروع سیستول قلبی

(۱) پوم، همزمان با شروع ثبت موج QRS

(۳) بسته شدن دریچه سه‌لختی، قوی و واضح

۵۵۳ کدام گزینه درباره قلب انسان سالم درست است؟

- (۲) در شروع سیستول دهلیزها، حجم خون بطن‌ها در حال افزایش است.
- (۴) هنگام سیستول بطن‌ها، قطعاً گره سینوسی - دهلیزی فاقد فعالیت است.

(۱) در طول سیستول بطن‌ها، فشار خون دهلیزها تغییری نمی‌کند

(۳) هنگام سیستول دهلیزها، پیام الکتریکی به گره دهلیزی - بطنی می‌رسد.

۵۵۴ در عملکرد طبیعی قلب یک فرد سالم، همزمان با در توار قلب، امکان وجود


- (۲) ثبت قله موج P - باز شدن دریچه دولختی - دارد
- (۴) پایان موج QRS - ورود خون به سرخرگ ششی - دارد

(۱) شروع موج QRS - ورود خون به بطن‌ها - ندارد

(۳) شروع موج T - ورود خون به سرخرگ ششی - ندارد

۵۵۵ در انسان، مقادیر خونی است که در یک خارج می‌شود.

- (۱) بروند قلبی - دقیقه از قلب
- (۲) بروند قلبی - دقیقه از بطن چپ
- (۳) حجم ضربه‌ای - ضربان از قلب
- (۴) حجم ضربه‌ای - ضربان از بطن‌ها



۵۵۶ کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«با توجه به شکل مقابل، مورد دریچه‌ای است که

(۱) ب - با فاصله کمی پس از قله موج QRS باز می‌شود.

(۲) الف - پس از پایان موج T و کاهش فشار بطن‌ها، بسته می‌شود.

(۳) ج - از چین خوردن درون شامه ایجاد شده و به صورت پک‌طرفه باز می‌شود.

(۴) د - طناب‌های ارجاعی موجب محدودیت در حرکت آن به سمت بالا می‌شوند.

۵۵۷ چند مورد، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«همزمان با شروع ثبت موج در توار قلب، دریچه باز است.»

(۱) الف - سه‌لختی - سینی سرخرگ ششی

(۲) ج - سینی آنورتی - دولختی

(۳) ۱

(۴) ۲

۵۵۸ در دوره قلبی یک فرد سالم، هنگامی که دریچه است، قطعاً

(۱) سینی بسته - مرحله ۴ / ۰ تانیه‌ای مشاهده می‌شود.

(۳) سینی باز - دهلیزها در حال انقباض‌اند.

۵۵۹ کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«همزمان با پخشی از توار قلب مقابل که با علامت سوال مشخص شده است،

(۱) فشار خون آنورت، حداقل مقدار خود را دارد.

(۲) خون تیره وارد برخی سرخرگ‌های بدن می‌شود.

(۳) فشار خون سرخرگ ششی از بطن راست کمتر است.

(۴) خون تیره سیاهرگ‌های اکلیلی وارد دهلیز راست می‌شود.

۵۶۰ در فردی با عملکرد طبیعی قلب،

(۱) میزان خون خارج شده از قلب در یک دقیقه، با میزان بروند قلبی متفاوت است.

(۲) در مرحله ۳ / ۰ تانیه‌ای از دوره قلبی، همه خون موجود در بطن چپ وارد آنورت می‌شود.

(۳) همه خون تیره موجود در بطن راست، در مرحله ۱ / ۰ تانیه‌ای دوره قلبی به آن وارد شده است.

(۴) همه خون وارد شده به قلب در مرحله ۴ / ۰ تانیه‌ای دوره قلبی، در همان مرحله وارد دهلیزها می‌شود.

۵۶۱ در توار قلب یک انسان سالم و در حال استراحت، در تمام فاصله بین دو انقباض بطنی می‌شود.

(۱) دیاستول دهلیزها مشاهده و خون به آن‌ها وارد

(۲) خون دارای اکسیژن وارد بطن‌ها

(۳) یک صدای قوی و گنگ از قلب شنیده

۵۶۲ شکل مقابل، یکی از مراحل چرخه ضربان قلب را نشان می‌دهد. همزمان با این مرحله،

(۱) مانع برای ورود خون روشن به بطن چپ وجود ندارد.

(۲) فشار خون بطن چپ به حداقل مقدار خود رسیده است.

(۳) صدای پوم را می‌توان با گوشی پزشکی از قفسه سینه شنید.

(۴) موج P ثبت و جریان الکتریکی در دیواره دهلیزها پخش می‌شود.

۵۶۳ کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

(۵) مرحله از دوره ضربان قلب یک فرد سالم و بالغ،

(۱) کوتاه‌ترین - نیمی از دریچه‌های قلب بسته‌اند.

(۳) کوتاه‌ترین - خون تیره نمی‌تواند از قلب خارج شود.

۵۶۴ در بررسی وضعیت قلب انسان، نمی‌توان با یک پوم.

(۱) با دقیق در صدای نظم کار قلب، به سالم بودن آن

(۳) داشتن حجم ضربه‌ای و تعداد ضربان‌ها، به بروند قلب



(۲) طولانی‌ترین - هیچ‌یک از پاخته‌های ماهیچه‌ای قلب تحریک نمی‌شوند.

(۴) طولانی‌ترین - پیام‌های الکتریکی منقبض‌کننده قلب تولید می‌شوند

(۲) بررسی توار قلب، به درجه سختی سرخرگ‌های اکلیلی

(۴) شنیدن صدای قلب، به اختلال در ساختار دریچه‌های آن

پایه دوازدهم

درسنامه + پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست ۳





دقت کنید: قرار نیست همه ویژگی‌های آمینو اسید به گروه R بستگی داشته باشند بلکه ویژگی‌های متحصر به فرد آمینو اسید به گروه R دارد یعنی بعضی ویژگی‌های آمینو اسید ارتباطی به گروه R ندارند: مثلاً خاصیت اسیدی آن به گروه کربوکسیل مربوط است.

۱ **ترکیب:** پیوند پپتیدی بین گروه آمین از یک آمینو اسید و گروه کربوکسیل از یک آمینو اسید دیگر برقرار می‌شود. این پیوند از طریق واکنش سنتز آبده و توسط یکی از آنزیم‌های موجود در رناتن (ریبوزوم) برقرار می‌شود.

۲ در یک انتهای هر زنجیره پلی‌پپتیدی، گروه آمین (NH_2) و در انتهای دیگر آن گروه کربوکسیل (COOH) وجود دارد.

دقت کنید: تفاوت پروتئین‌های مختلف به نوع، تعداد و ترتیب آمینو اسیدهای آن‌ها بستگی دارد: در حالی که تفاوت آمینو اسیدهای مختلف به گروه R آن‌ها مربوط است، پس می‌توان نتیجه گرفت که نوع گروه‌های R آمینو اسیدهای ساختار، شکل و عملکرد پروتئین‌های را تعیین می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گروه R، قطبی یا ناقطبی بودن آن است.

۳ پلی‌پپتید، زنجیره‌ای بلند و بدون انشعاب (شاخه) از آمینو اسیدهای ساختار خطی دارد.

۴ می‌دانیم که پلی‌پپتید با نوعی واکنش سنتز آبده تشکیل می‌شود. در این واکنش، به تعداد پیوندهای پپتیدی که تشکیل می‌شوند، مولکول‌های آب آزاد می‌گردند. هنگام تجزیه پلی‌پپتید با واکنش آبکافت (هیدرولیز) نیز به تعداد پیوندهای پپتیدی که شکسته می‌شوند، مولکول آب مصرف می‌گردد.

دقت کنید: نمی‌توان گفت هر واکنشی که در آن آب مصرف می‌شود، از نوع هیدرولیز است؛ به عنوان مثال درون گویچه‌های قرمز انسان واکنش انجام می‌شود که طی آن آب و کربن دی‌اکسید ترکیب می‌شوند. در این واکنش آب مصرف می‌شود اما هیدرولیز صورت نمی‌گیرد.

۵ **ترکیب:** هیدرولیز کامل یک پلیمر، آن را به مونومرهای سازنده تبدیل می‌کند اما گاهی نیز هیدرولیز به صورت ناقص انجام می‌شود. به همین دلیل، مولکول‌هایی که آزاد می‌شوند مونومر نیستند: مانند موارد ذکر شده: ۱ تبدیل پروتئین به پپتیدهای کوچک‌تر توسط پپسین در معده ۲ تبدیل نشاسته به مولکول‌هایی از قبیل مالتوز در دهان توسط آمیلاز ۳ تبدیل غذا به قطعات کوچک‌تر توسط آنزیم‌های ترشحی حفره گوارشی هیدر.

۶ تشکیل پیوند پپتیدی به انرژی نیاز دارد و انرژی مورد نیاز از مولکول‌های مثل ATP تأمین می‌شود.

۷ در یاخته، دنا و رنا ذخیره و انتقال اطلاعات را بر عهده دارند و پروتئین‌ها به انجام فرایندهای مختلف کمک می‌کنند.

۸ شکل دنا با تغییر نوع نوکلئوتیدهای آن تغییر نمی‌کند اما تغییر در نوع آمینو اسیدهای پروتئین می‌تواند سبب تغییر شدید در شکل آن شود!

۹ تجزیه موادی مثل آمینو اسیدها در یاخته، متوجه به تولید ماده بسیار سمی به نام آمونیاک می‌شود که از طریق جریان خون به کبد می‌رسد و کبد آن را با کربن دی‌اکسید ترکیب می‌کند و اوره می‌سازد.

۱۰ **ویژه:** جرم دو آمینو اسید متعلق به هم، کمتر از مجموع جرم همان دو آمینو اسید به صورت آزاد است اچون هنگام اتصال دو آمینو اسید، یک مولکول آب آزاد می‌شود.

۱۱ پروتئازها، آنزیم‌هایی هستند که واکنش آبکافت پیوندهای پپتیدی را کاتالیز می‌کنند: مانند پپسین و پروتئازهای لوزالمعده و روده.

▪ سطوح ساختاری پروتئین‌ها


اصل مطلب

▪ شکل فضایی پروتئین، نوع عمل آن را مشخص می‌کند. یکی از راه‌های پی‌بردن به شکل پروتئین، استفاده از پرتوهای ایکس است. اولین پروتئینی که ساختار آن کشف شد، میوگلوبین بود.

▪ ساختار پروتئین‌ها در چهار سطح بررسی می‌شود که هر ساختار مبنای تشکیل ساختار بالاتر است.

۳۷ **ویژه:** در یاخته‌هایی که با سرعت زیاد تقسیم می‌شوند، در واقع مدت زمان اینترفالز کاهش می‌باشد و در نتیجه، مدت زمان چرخه یاخته‌ای کمتر می‌شود.

۳۸ **ترکیب:** تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی در کروموزوم‌های مختلف انسان با یکدیگر متفاوت است. هر چهقدر یک کروموزوم بزرگ‌تر باشد، تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی آن بیشتر است. بنابراین کروموزوم شماره ۱ بیشترین و کروموزوم شماره ۲۱ کمترین تعداد نقاط آغاز همانندسازی را دارد.



پروتئین‌ها

سوم

▪ آمینو اسیدها و پلی‌پپتید

اصل مطلب

▪ پروتئین‌ها بسیارهایی از آمینو اسیدها هستند. نوع، ترتیب و تعداد آمینو اسیدهای پروتئین، ساختار و عمل آن را مشخص می‌کند.

▪ هر آمینو اسید، یک کربن مرکزی دارد که موارد زیر به آن متصل است:


۱ گروه آمین (NH_2) ۲ گروه کربوکسیل (COOH) ۳ هیدروژن R

▪ گروه R در آمینو اسیدهای مختلف، متفاوت است و ویژگی‌های متحصر به فرد هر آمینو اسید به آن بستگی دارد.

▪ هر آمینو اسید می‌تواند در شکل دهنده پروتئین مؤثر باشد و تأثیر آن به ماهیت شیمیایی گروه R بستگی دارد. آمینو اسیدها در طبیعت انواع گوناگونی دارند اما فقط ۲۰ نوع آن‌ها در ساختار پروتئین‌ها به کار می‌روند.

▪ آمینو اسیدها می‌توانند با نوعی پیوند اشتراکی به نام پیوند پپتیدی به یکدیگر متصل شوند. تشکیل پیوند پپتیدی با واکنش سنتز آبده و با حضور آنزیم انجام می‌شود و با تشکیل هر پیوند پپتیدی، یک مولکول آب آزاد می‌شود.

▪ وقتی تعدادی آمینو اسید با پیوند پپتیدی به هم وصل می‌شوند، زنجیره‌ای از آمینو اسیدها به نام پلی‌پپتید ایجاد می‌شود. هر پروتئین از یک یا چند زنجیره پلی‌پپتیدی ساخته شده است و ترتیب خاصی از آمینو اسیدها را دارد.



۱۵ برهمنش‌های آب‌گریز، پیوند اشتراکی محسوب نمی‌شوند، بلکه بخش‌های آب‌گریز دو مولکول که تلاش می‌کنند دور از آب قرار بگیرند، به هم نزدیک می‌شوند.


۱۶ همه سطوح ساختاری پروتئین‌های توالی آمینواسیدهای ساختار اول بستگی دارد.

۱۷ ساختار دوم پروتئین‌ها ثبات زیادی ندارد، اما ساختار سوم آن‌ها دارای ثبات نسبی است.

۱۸ در تشکیل ساختار سوم، گروه‌های R آب‌گریز، به یکدیگر نزدیک می‌شوند تا در معرض آب نباشند. سایر آمینواسیدهای با گروه R آبدوست، در سطح پروتئین قرار می‌گیرند.

زوم: در ساختار سوم یک پروتئین ممکن است بخش‌های مارپیچی و صفحه‌ای با هم مشاهده شوند! اگر به ساختار سوم در شکل ستون قبل دقیق کنید، متوجه خواهد شد که بخشی از زنجیره به صورت مارپیچ و بخش دیگری از آن به صورت صفحه‌ای است.

۱۹ فقط بعضی پروتئین‌ها از چند رشته پلی‌پپتید تشکیل شده‌اند و در نتیجه، فقط بعضی پروتئین‌ها ساختار چهارم دارند.



۲۰ میوگلوبین، نوعی پروتئین آهن‌دار تکرر شمایی با ساختار نهایی سوم و هموگلوبین نوعی پروتئین آهن‌دار چهار رشته‌ای با ساختار زنجیره پپتیدی چهارم است.

۲۱ میوگلوبین دارای یک گروه هم است، در باخته‌های مارپیچی وجود دارد و می‌تواند مقداری اکسیژن ذخیره کند؛ در حالی که هموگلوبین در گویجه‌های قرمز وجود دارد و می‌تواند در اتصال با اکسیژن، کربن دی‌اکسید و کربن‌مونو‌اکسید باشد.

۲۲ هر نوع تغییر در توالی آمینواسیدهای زنجیره پلی‌پپتید، قطعاً موجب تغییر در ساختار اول پروتئین می‌شود اما تأثیر آن بر عملکرد پروتئین، به نوع آمینواسید و محل تغییر در پروتئین بستگی دارد.

۲۳ در ساختار دوم پروتئین‌ها (مثل مارپیچی و صفحه‌ای)، فقط بعضی آمینواسیدها در پیوندهای هیدروژنی شرکت دارند.

۲۴ هر یک از زنجیره‌های هموگلوبین، به تنهایی ساختارهای اول، دوم و سوم را دارد؛ زمانی که این زیرواحدها کنار هم آرایش می‌یابند، ساختار چهارم ایجاد می‌شود.


جمع‌بندی ساختارهای پروتئین‌ها

ساختار نهایی چه پروتئینی است؟	شكل ظاهری	عامل تشکیل	ساختار
هیچ پروتئینی	زنجره خطی و بدون انشعاب	پیوندهای پپتیدی	اول
خارج از کتاب درسی!	شكل‌هایی از قبیل مارپیچی و صفحه‌ای	پیوندهای هیدروژنی	دوم
پروتئین‌های تکرر شمایی مانند میوگلوبین	شكل‌هایی متقاوت	تشکیل: برهمنش‌های آب‌گریز تثبیت: پیوندهایی مثل هیدروژنی، اشتراکی و یونی	سوم
پروتئین‌های چندرشمه‌ای مانند هموگلوبین	متقاوت در پروتئین‌های مختلف	چهارم آرایش زیرواحدها کنار هم	

ساختار اول - توالی آمینواسیدها: نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینواسیدها، ساختار اول پروتئین‌ها را تعیین می‌کنند. این ساختار با تشکیل پیوندهای پیتیدی شکل می‌گیرد و خطی است. همه سطوح دیگر ساختاری پروتئین‌ها به این ساختار بستگی دارند.

ساختار دوم - الگویی از پیوندهای هیدروژنی: با تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین بخش‌هایی از زنجیره پلی‌پپتیدی شکل می‌گیرد. ساختار دوم به چند صورت دیده می‌شود که دو نمونه معروف آن‌ها ساختار مارپیچ و ساختار صفحه‌ای است. ساختار سوم - تاخورده و متصل بهم: در این ساختار، تاخورده‌گی‌های بیشتر صفحات و مارپیچ‌ها سبب ایجاد شکل‌های متفاوتی می‌شود. تشکیل این ساختار در اثر برهمنش‌های آب‌گریز و تثبیت آن با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی، اشتراکی و یونی است. ساختار نهایی میوگلوبین، ساختار سوم است.

ساختار چهارم - آرایش زیرواحدها: این ساختار با کنار هم قرار گرفتن دو یا چند زنجیره پلی‌پپتیدی ایجاد می‌شود و هر یک از زنجیره‌ها در شکل‌گیری آن نقش کلیدی دارد. نحوه آرایش زیرواحدها کنار یکدیگر، ساختار چهارم نامیده می‌شود.



۱۲ در ایجاد ساختارهای دوم پروتئین‌ها، پیوند هیدروژنی بین اتم‌های H و O مربوط به دو آمینواسید تشکیل می‌شود.

۱۳ هموگلوبین، پروتئینی است که از چهار زنجیره پلی‌پپتیدی تشکیل شده است که دو بهدو مشابه‌اند (دو زنجیره آلفا و دو زنجیره بتا). شکل‌گیری هموگلوبین طی مراحل ذکر شده انجام می‌شود:

۱ دور زنجیره آلفا و دور زنجیره بتا به صورت جداگانه ساخته می‌شوند (ساختار اول).

۲ هر یک از این زنجیره‌ها به شکل مارپیچ در می‌آیند (ساختار دوم).

۳ هر یک از زنجیره‌ها به صورت یک زیر واحد، تاخورده و شکل خاصی پیدا می‌کند (ساختار سوم).

۴ این چهار واحد در کنار هم قرار می‌گیرند و ساختار چهارم هموگلوبین را می‌سازند.

۵ هر یک از زیرواحدهای هموگلوبین، یک بخش پروتئینی (گلوبین) و یک بخش غیرپروتئینی (هم) دارد. بخش هم دارای یک یون آهن (Fe²⁺) است.

▶ نقش پروتئین‌ها

اصل مطلب



- ۲۲ در هر پروتئین، حداقل تعدادی از آمینواسیدهای توانند در پیوندهای هیدروژنی شرکت کنند. چون همه پروتئین‌ها ساختار دوم را دارند.
- ۲۳ مارپیچ پلی‌پپتیدی شامل یک زنجیره از مونومرها (آمینواسیدهای) اما مارپیچ دنا شامل دو رشته از مونومرها (نوکلئوتیدهای) است. دقت کنید که هر دو ساختار بر اثر پیوندهای هیدروژنی ایجاد می‌شوند.
- ۲۴ تاخوردگی زنجیره پلی‌پپتیدی در ایجاد ساختارهای دوم و سوم پروتئین‌ها مشاهده می‌شود.
- ۲۵ هر زنجیره پلی‌پپتیدی سازنده هموگلوبین دارای ساختار دوم مارپیچی است. به عبارت دیگر در مولکول هموگلوبین، ساختار صفحه‌ای مشاهده نمی‌شود.
- ۲۶ بعضی پروتئین‌ها دارای اجزایی غیر از آمینواسید هستند: مانند هموگلوبین و میوگلوبین که گروه Fe^{+2} دارند.
- ۲۷ **ویژه** آلبومین و هموگلوبین از پروتئین‌هایی هستند که در انتقال مواد در خون نقش دارند. عامل داخلی معده نیز در جذب B_{12} در روده باریک نقش دارد.
- ۲۸ **ترکیبی** پادتن‌ها از گلوبولین‌های دفاعی ترشحی هستند که به مایعات بدن (خون، لطف و مایع بین یاخته‌ای) می‌رسند.
- ۲۹ در یوکاریوت‌ها، پروتئین‌ها توسط رناتن‌هایی ساخته می‌شوند که در یکی از محل‌های زیر قرار دارند:
- ۱ به صورت آزاد در ماده زمینه سیتوپلاسم
 - ۲ چسبیده به غشاء شبکه آندوپلاسمی زیر
 - ۳ درون راکیزه و دیسه

آنزیم‌ها

اصل مطلب



- واکنش‌های شیمیایی در صورتی با سرعت مناسب انجام می‌شوند که انرژی اولیه کافی برای انجام آن‌ها وجود داشته باشد. این انرژی را انرژی فعال‌سازی می‌نامند. آنزیم‌ها امکان برخورد مناسب مولکول‌ها را افزایش و انرژی فعال‌سازی را کاهش می‌دهند و با این کار، سرعت واکنش‌های انجام‌شدن را بیشتر می‌کنند. ساختار آنزیم‌ها: بیشتر آنزیم‌ها پروتئینی هستند و در ساختار خود، بخشی به نام جایگاه فعال دارند که محل قرار گرفتن پیش‌ماده است. ترکیباتی که در اثر فعالیت آنزیم تولید می‌شوند، فراورده یا محصول نام دارند.
- ویژگی‌های آنزیم‌ها:**

- ۱ بیشتر آن‌ها ساختار پروتئینی دارند: بعضی آنزیم‌ها نیز غیرپروتئینی هستند، مانند بعضی رناها.
- ۲ آنزیم‌ها عمل اختصاصی دارند: یعنی هر آنزیم روی یک یا چند پیش‌ماده خاص مؤثر است.
- ۳ آنزیم‌ها در همه واکنش‌های شیمیایی بدن جانداران که شرکت می‌کنند: سرعت واکنش را افزایش می‌دهند اما در پایان واکنش، دست‌نحوerde باقی می‌مانند تا بدن بتواند بارها از آن‌ها استفاده کند. بنابراین یاخته‌ها به مقدار کم آنزیم نیاز دارند.

هوامول مؤثر بر فعالیت آنزیم‌ها:

- ۱ **pH** معیط: هر آنزیم در یک **pH** ویژه، بهترین فعالیت را دارد که به آن **pH** بینه می‌گویند.
- ۲ دما: آنزیم‌های بدن انسان، معمولاً در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد، بهترین فعالیت را دارند. افزایش یا کاهش دما می‌تواند آنزیم را غیرفعال کند.
- ۳ غلظت آنزیم و پیش‌ماده: با افزایش مقدار آنزیم، تولید فراورده در واحد زمان افزایش می‌یابد.
- افزایش غلظت پیش‌ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد نیز تا حدی می‌تواند باعث افزایش سرعت شود ولی این افزایش تا زمانی ادامه می‌یابد که تمامی چایگاه‌های فعال با پیش‌ماده اشغال شوند، در این هنگام سرعت واکنش ثابت می‌شود.

▪ پروتئین‌ها، متوجه ترین گروه مولکول‌های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند و در فرایندها و فعالیت‌های متفاوتی شرکت دارند. مهم‌ترین نقش‌های پروتئین‌ها عبارت‌اند از:

- ۱ **آنژیمی:** به عنوان کاتالیزورهای زیستی، سرعت واکنش‌های شیمیایی خاصی را افزایش می‌دهند.
- ۲ **گیرنده:** پروتئین‌هایی هستند که در سطح یاخته قرار می‌گیرند: مانند گیرنده‌های پادگنی که در سطح لنقوسیت‌ها قرار دارند.
- ۳ **انتقال دهنده:** مانند هموگلوبین که گازهای تنفسی را در خون انتقال می‌دهد و پمپ سدیم - پتاسیم که یون‌های سدیم و پتاسیم را در عرض غشا جابه‌جا می‌کند.
- ۴ **استحکامی:** مثلاً کلارن که باعث استحکام بافت پیوندی می‌شود و به فراوانی در رباط و زردی وجود دارد.
- ۵ **اقباض:** اکتین و میوزین، پروتئین‌هایی هستند که لغزیدن آن‌ها روی یکدیگر، موجب اقباض ماهیچه می‌شود.
- ۶ **هورمون:** بیشتر هورمون‌ها از جنس پروتئین هستند و در ردودبل کردن پیام بین یاخته‌های بدن نقش دارند: مانند اکسی‌توسین و انسولین.
- ۷ **تنظیمی:** مثلاً پروتئین‌هایی مانند مهارکننده در فعل و غیرفعال کردن زن‌ها نقش دارند.

۲۵ **ویژه** بعضی پروتئین‌ها ممکن است بیش از یک نوع نقش داشته باشند: مثلاً پمپ سدیم - پتاسیم، علاوه بر جابه‌جا کردن یون‌ها، نقش آنژیمی نیز دارد. همچنین مولکول میوزین علاوه بر این که در اقباض ماهیچه نقش دارد، نقش آنژیمی نیز دارد. نقش آنژیمی پمپ سدیم - پتاسیم و میوزین، موجب هیدرولیز ATP و آزاد کردن انرژی می‌شود.

فلش‌بک: بافت پیوندی از انواع یاخته‌ها، ماده زمینه‌ای و انواعی از رشته‌های پروتئینی تشکیل شده است. مهم‌ترین رشته‌های پروتئینی که در بافت پیوندی به کار می‌روند عبارت‌اند از رشته‌های کلارن و رشته‌های ارتجاعی (کشسان). رشته‌های کلارن قطور و محکم هستند و موجب استحکام بافت پیوندی می‌شوند. رشته‌های ارتجاعی نیز موجب کشسانی و انعطاف‌پذیری بافت پیوندی می‌شوند.

۲۶ وجود رشته‌های کلارن در بخش درونی پوست بدن انسان (درم) آن را به سدی محکم و غیرقابل نفوذ تبدیل و مانع در برابر نفوذ میکروب‌ها و عوامل خارجی ایجاد کرده است.

۲۷ **ترکیبی** بعضی پروتئین‌ها در انعقاد خون نقش دارند: مانند عامل انعقادی شماره ۸، پروترومبین و فیبرینوزن.

۲۸ **ترکیبی** بعضی پروتئین‌ها نقش دفاعی دارند: مانند پادتن، پرفورین، ایترفرون، پروتئین مکمل و لیزوزیم.

۲۹ **ترکیبی** تقسیم سیتوپلاسم یاخته‌های جانوری نیز با کمک پروتئین‌های اقباضی (اکتین و میوزین) انجام می‌شود.

۳۰ **ترکیبی** انسولین، هورمون پروتئینی است که در پاسخ به افزایش قند خون از لوز‌المعده ترشح می‌شود و با اثر بر یاخته‌ها (به‌ویژه کبد و ماهیچه‌ها) سبب کاهش قند خون می‌شود.

۳۱ **ترکیبی** اکسی‌توسین هورمون پروتئینی است که توسط جسم یاخته‌ای نورون‌های هیپو‌تalamوس ساخته و در هیپوفیز پسین ذخیره می‌شود. این هورمون در موقع لزوم از هیپوفیز پسین به جریان خون آزاد می‌شود و باعث اقباض رحم هنگام زایمان و اقباض ماهیچه‌های صاف غدد شیردهی می‌شود.

۵۲ ترکیبی: بیشتر آنزیم‌های بدن انسان در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بهترین فعالیت را دارند اما دمای مناسب برای فعالیت برش خی آنزیم‌ها در بیضه انسان حدود ۳۴ درجه سانتیگراد است.

۵۳ همه آنزیم‌ها درون یاخته تولید می‌شوند اما محل فعالیت آن‌ها می‌تواند درون یاخته، غشای یاخته یا خارج از یاخته باشد. مثلاً آنزیم‌های ترشحی دستگاه گوارش (مثل آمیلاز، پسپین و لیپاز) خارج یاخته و آنزیم‌های مؤثر در تنفس یاخته‌ای، فتوسترات، همانندسازی و رونویسی درون یاخته فعالیت می‌کنند. محل فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم نیز غشای یاخته است.

◀ کاربرد آنزیم‌های در صنعت

اصل مطلب



- از آنزیم‌های در صنایع متفاوتی مانند تولید دارو، خوراکی، آشامیدنی و سوختهای زیستی استفاده می‌شود. مثلاً آنزیم سلولاز که در تجزیه سلولز به گلوکز نقش دارد، از آنزیم‌های مورد استفاده در کاغذسازی و تولید سوخت زیستی است.

- آنزیم‌ها در صنایع غذایی، بهویژه صنایع لبنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

- مایه پنیر در واقع نامی عمومی برای آنزیم‌هایی است که با دلمه کردن پروتئین شیر، آن را به پنیر تبدیل می‌کنند. مایه پنیر را به طور سنتی از معده نوزادان (شیرخوران) چانورانی مانند گوسقدت و گاو به دست می‌آورند. امروزه انواعی از مایه پنیرها وجود دارند که از گیاهان و ریز جانداران به دست می‌آیند. در صنایع شوینده با استفاده از لیپازها، پروتئازها و آمیلازها انواعی از شوینده‌ها با قدرت تمیز کنندگی بالا تولید می‌شوند.

۵۴ سلولز، از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل شده است. آنزیم سلولز، با شکستن پیوندهای اشتراکی بین مولکول‌های گلوکز، سلولز را به تک‌پاره‌ای گلوکز تجزیه می‌کند.

دقت کنید: سلولز، نوعی پلی‌ساکارید و سلولاز نوعی آنزیم پروتئینی است.

۵۵ زیست‌شناسان با به کار گیری آنزیم سلولاز می‌توانند به بهبود و افزایش تولید سوخت‌های زیستی کمک کنند.

۵۶ سوخت‌های زیستی همانند سوخت‌های فسیلی منشأ زیستی دارند و از تجزیه پیکر جانداران به وجود آمده‌اند. با این تفاوت که سوخت‌های فسیلی حاصل تجزیه جانداران در گذشته‌های دور هستند؛ در حالی که سوخت‌های زیستی از تجزیه جانداران امروزی به دست می‌آیند.

۵۷ ترکیبی: در تولید پنیر دو عمل مهم انجام می‌شود: ۱) تخمیر لاکتیک توسط باکتری‌ها، با تولید لاکتیک اسید، pH اسیدی خاصی را فراهم می‌کند.

۲) آنزیم موجود در مایه پنیر، با دلمه کردن پروتئین شیر در pH اسیدی، آن را به پنیر تبدیل می‌کند.

۵۸ به طور طبیعی در بعضی گیاهان و ریز جانداران آنزیم‌هایی ساخته می‌شوند که امروزه آنها را استخراج و به عنوان مایه پنیر برای تولید بعضی از انواع پنیر مورد استفاده قرار می‌دهند.

۵۹ ترکیبی: در زیست‌فتاوری سنتی، مایه پنیر از معده نوزاد پستاندارانی مثل گوسقدت و گاو استخراج می‌شود، اما امروزه انواعی از مایه پنیرها از گیاهان و ریز جانداران به دست می‌آیند.

۶۰ ترکیبی: امروزه برای تولید مایه پنیر می‌توان رن سازنده آنزیم را به جاندارانی از قبیل باکتری وارد کرد. این عمل از طریق مهندسی زنگی انجام می‌شود. همچنین با استفاده از روش‌های مهندسی پروتئین می‌توان پایداری و کارآیی این آنزیم‌ها بهمنظور استفاده در صنایع را افزایش داد.


۶۱ استفاده از آنزیم در تولید شوینده‌ها، سبب افزایش قدرت تمیز کنندگی آنها می‌شود. سه نوع کلی آنزیم‌های مورد استفاده در شوینده‌ها عبارت‌اند از: ۱) لیپازها برای تجزیه چربی‌ها ۲) پروتئازها برای تجزیه پروتئین‌ها ۳) آمیلازها برای تجزیه کربوهیدرات‌ها

۴۰ بعضی آنزیم‌ها برای فعالیت به یون‌های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مانند ویتامین‌های نیاز دارند. مواد آلی که به آنزیم کمک می‌کنند، کوآنزیم نامیده می‌شوند.

دقت کنید: یون‌های فلزی که به فعالیت آنزیم‌ها کمک می‌کنند، کوآنزیم محسوب نمی‌شوند.

۴۱ بعضی مواد سمی مانند آرسنیک و سیانید با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع از فعالیت آن می‌شوند. بعضی مواد سمی به همین طریق موجب مرگ می‌شوند

۴۲ واکنش‌های سوخت و سازی دو دسته‌اند: بعضی از این واکنش‌ها موجب تجزیه پیش‌ماده به مولکول‌های کوچک‌تر می‌شوند و بعضی دیگر از این واکنش‌ها سبب ترکیب شدن دو یا چند پیش‌ماده و تولید محصول بزرگ‌تر می‌شوند. هر دوی این واکنش‌ها با کمک آنزیم‌ها صورت می‌گیرند.



۴۳ بعضی آنزیم‌ها بیش از یک نوع واکنش را کاتالیز می‌کنند.

مثال ۱: در فرایند همانندسازی دنا، آنزیم دنابسپاراز می‌تواند فعالیت بسپارازی (تشکیل پیوند فسفودی‌استر) و یا فعالیت نوکلئازی (شکستن پیوند فسفودی‌استر) داشته باشد.

مثال ۲: در فرایند همانندسازی دنا، آنزیم هلیکاز علاوه‌بر باز کردن مارپیچ دن، دو رشته آن را نیز از هم باز می‌کند.

مثال ۳: در فرایند رونویسی، آنزیم رنابسپاراز شکستن پیوندهای هیدروزئی و تشکیل پیوند فسفودی‌استر را بر عهده دارد.

مثال ۴: آنزیم رویسکو در یاخته‌های فتوسترات کننده گیاهان، دارای دو نوع فعالیت (اکسیرنازی و کربوکسیلازی) است.

۴۴ غیرفعال شدن آنزیم‌ها بر اثر افزایش دما، برگشت تا پذیر است، اما آنزیم‌هایی که بر اثر دمای پایین غیرفعال می‌شوند، با برگشت دما به حالت طبیعی، می‌توانند به حالت فعال برگردند.

۴۵ آنزیم‌ها در pH بھینه بهترین فعالیت خود را دارند. pH بیشتر مایعات بدن بین ۶ و ۸ است: مثلاً pH خون حدود ۷/۴ است. pH بھینه آنزیم پسین حدود ۲ است و در شیره معده بهترین فعالیت را دارد. pH بھینه آنزیم‌های لوزالمعده، حدود ۸ است. به همین دلیل در روده کوچک بهترین فعالیت را دارند. قبل از تجزیه پروتئازهای لوزالمعده پس از ورود به ابتدای روده باریک (دوازده‌هه) فعال می‌شوند.

۴۶ ترکیبی: در افراد مبتلا به دیابت شیرین، به دلیل تجزیه چربی‌ها pH خون کاهش می‌یابد و کمتر از ۷/۴ می‌شود.

۴۷ ترکیبی: هورمون گاسترین با اثر بر یاخته‌های کناری معده، ترشح اسید معده را افزایش می‌دهد و سبب ایجاد pH بھینه برای فعالیت پسین می‌شود.

۴۸ ترکیبی: هورمون سکرتین با اثر بر لوزالمعده، ترشح بیکربنات را افزایش می‌دهد. ورود بیکربنات به دوازده‌هه، سبب ایجاد pH بھینه برای فعالیت آنزیم‌های شیره لوزالمعده می‌شود.

۴۹ آنزیم‌های لیزوزومی که درون اندامک کافنده‌تن (لیزوزوم) قرار دارند، درون یاخته فعالیت می‌کنند. مثلاً وقتی ذرات بزرگ غذایی از طریق درون‌بری وارد یاخته می‌شوند، درون و اکتوپل غذایی قرار می‌گیرند. کافنده‌تن به واکنش غذایی می‌پیوندد و آنزیم‌های گوارشی خود را به درون آن می‌ریزد.

۵۰ ترکیبی: تب، نوعی سازوکار دفاعی است که سبب کاهش فعالیت میکروب‌ها می‌شود اما اگر تب شدید باشد، یعنی دمای بدن بیش از اندازه افزایش یابد، می‌تواند سبب تغییر شکل غیرقابل بازگشت جایگاه فعال آنزیم‌ها شود.

۵۱ اگرچه آنزیم‌ها در واکنشی که آن را کاتالیز می‌کنند، دست‌نخورده می‌مانند اما با گذشت زمان، مقدار آنزیم‌ها کاهش می‌یابد و لازم است دوباره تولید شوند.



۳۲۴۸. کدام گزینه در مورد همانندسازی دنا به روش نیمه حفاظتی صحیح نیست؟

- (۱) در هر دوراهی همانندسازی تعداد آنزیم‌های دنابسپاراز، دو برابر تعداد آنزیم‌های هلیکاز فعال است.
- (۲) در همانندسازی یک دنای حلقوی، هلیکازهای یک جایگاه آغاز همانندسازی ابتدا از هم دور و سپس به هم نزدیک می‌شوند.
- (۳) همواره تنوع پیوندهای شکسته شده در محل همانندسازی کمتر از تنوع پیوندهای تشکیل شده است.
- (۴) در دنای خطي، آنزیم‌های دنابسپاراز موجود در دوراهی همانندسازی ایجاد شده در هر جایگاه آغاز، همواره از هم فاصله می‌گیرند.

۳۲۴۹. چند مورد از موارد زیر در ارتباط با همانندسازی دنا نادرست است؟

- (الف) در همانندسازی نیمه حفاظتی همانند غیر حفاظتی، چگالی مولکول‌های حاصل از اولین دور همانندسازی می‌تواند برابر باشد.
- (ب) در ساختار پیش‌ماده آنزیم هلیکاز برخلاف فراورده آنزیم دنابسپاراز پیوند هیدروژنی وجود ندارد.
- (ج) فعالیت نوکلئازی دنابسپاراز در دوراهی همانندسازی با شکستن پیوند هیدروژنی میان جفت‌باز اشتباه همراه است.
- (د) در یاخته‌های پروکاریوتی همانند یوکاریوت‌ها، قبل از فعالیت دنابسپاراز، دو رشته دنا توسط آنزیم هلیکاز کاملاً از هم باز می‌شوند.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۳۲۵۰. کدام عبارت به طور حتم در مورد فرایند همانندسازی دنا در همه جانداران صحیح است؟

- (۱) ممکن است هر یک از نوکلئوتیدهای سازنده دو رشته مولکول دنا، طی فرایند ویرایش با یک نوکلئوتید دیگر جایگزین شود.
- (۲) در هنگام طویل شدن هر رشته دنا همراه با افزایش غلظت فسفات‌های آزاد درون هسته، انرژی مورد نیاز فرآیند تأمین می‌شود.
- (۳) باز کردن پیچ‌وتاب دنا از گروهی از پروتئین‌های هسته همانند باز کردن مارپیچ مولکول دنا، توسط آنزیم هلیکاز صورت نمی‌گیرد.
- (۴) آنزیم‌های پروتئینی دخیل در فرایند همانندسازی دنا همگی درون سیتوپلاسم ساخته شده‌اند و برخی از آن‌ها قابلیت نوکلئازی ندارند.

۳۲۵۱. چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

- ادر یک یاخته پروکاریوتی، هر آنزیم که توانایی را دارد، ممکن است
- (الف) شکستن پیوندهای موجود در پله‌های نردبان پیچ خورده دنا - بیش از یک بار در طول زندگی یاخته آن فعالیت کند.
 - (ب) ایجاد پیوند بین فسفات و قند دتوکسی‌ربیوز - در صورت نیاز، هر پیوند بین فسفات و قند دتوکسی‌ربیوز را بشکند.
 - (ج) تولید رشته پلی‌نوکلئوتیدی - در هر بار فعالیت، نوکلئوتیدهای مکمل را تنها در مقابله یکی از رشته‌های دنا قرار دهد.
 - (د) قرار دادن نوکلئوتیدهای مکمل در مقابل نوکلئوتیدهای دنا - هنگام فعالیت خود، به هر دو رشته مولکول دنا اولیه متصل شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

پروتئین‌ها

گفتار
سوم

آمینواسیدها و پروتئین‌ها

۳۲۵۲. کدام گزینه، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
هر آمینواسید

- (۱) موجود در طبیعت را می‌توان در ساختار پروتئین‌ها یافت.
- (۲) بخشی دارد که از تغییر آن، نهایتاً اوره ساخته می‌شود.
- (۳) گروه‌های منحصر به فردی دارد که به کریم مرکزی آن متصل‌اند.
- (۴) نقش تعیین کننده‌ای در شکل و کار پروتئین ایفا می‌کند.

۳۲۵۳. کدام عبارت نادرست است؟

- (۱) در هر زنجیره پلی‌پپتید، فقط یکی از آمینواسیدها، گروه NH_2 متصل به کریم مرکزی دارد.
- (۲) پس از تولید یک زنجیره پلی‌پپتیدی، ممکن است بخشی از توالی درونی آن حذف شود.
- (۳) هر پلی‌پپتید موجود در ساختار پروتئین‌ها، پلیمری بدون انشعاب از آمینواسیدهای است.
- (۴) با نزدیک شدن گروه‌های کربوکسیل و آمین به کریم و انجام واکنش سنتز آبدهی، آمینواسید تشکیل می‌شود.

۳۲۵۴. کدام عبارت، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟
ادر شروع تشکیل ساختار سوم پروتئین‌ها،

- (۱) برخلاف ساختار دوم، پیوندهای هیدروژنی دخالتی ندارند.
- (۳) گروه‌های R ، آمین و کربوکسیل در پیوندهای یونی شرکت می‌کنند.

۳۲۵۵. کدام گزینه، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد،

- (۱) در تارهای ماهیچهای برای انتقاض سریع ویژه شده‌اند، به مقدار زیادی وجود دارد.
- (۳) مولکولی با گروه‌های H است و می‌تواند مقداری اکسیژن ذخیره کند.

۳۲۵۶. کدام گزینه، برای تکمیل جمله زیر مناسب است؟
مولکولی که در شکل مقابله دیده می‌شود،

- (۱) در اثر برهم‌کنش‌های آب‌گیریز ثبت شده است.
- (۳) نتیجه تشکیل رشته‌های مارپیچ و صفحه‌ای است.

۳۲۵۷. کدام عبارت از نظر درستی یا نادرستی با سایرین متفاوت است؟

- (۱) ساختار نهایی زنجیره هموگلوبین، نمی‌تواند ساختار چهارم باشد.
- (۳) بعضی پروتئین‌های چند رشته‌ای ممکن است، فاقد ساختار چهارم باشند.



(۲) می‌تواند بخشی از ساختار سوم پروتئین باشد.

(۴) ایجاد کننده رنگ یاخته‌های ماهیچهای اسکلتی است.

(۲) در انسان، ساختار نهایی هر پروتئین نتیجه آرایش زیرواحدهاست.

(۴) یک یا چند پلی‌پپتید با آرایش زیرواحدها، ساختار چهارم پروتئین را پدید می‌آورند.

۳۳۵۸. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

- الف) اولین ساختاری که بر اثر تاخوره‌گی پلی‌پپتید ایجاد می‌شود، ساختار سوم است.
- ب) شروع تشکیل ساختار سوم پروتئین‌ها می‌تواند نتیجهٔ پیوندهای مختلفی باشد.
- ج) ساختار دوم، همانند ساختار سوم پروتئین‌ها به ویژگی‌های گروه R مربوط است.
- د) پیوند اشتراکی علاوه بر ساختار اول می‌تواند در ساختار سوم پروتئین‌ها نیز مؤثر باشد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۳۳۵۹. گدام عبارت از نظر درستی یا نادرستی با سایرین متفاوت است؟

- ۱) گروه R، بیشترین تعداد اتم‌های هر آمینواسید را در خود جای داده است.
- ۲) هر آمینواسید فقط می‌تواند یک اتم هیدروژن در ساختار خود داشته باشد.
- ۳) در یک رشتهٔ پلی‌پپتید، گروه‌های آمین و کربوکسیل ممکن است مربوط به متیونین باشند.
- ۴) خصوصیات منحصر به فرد هر آمینواسید به گروه‌های متصل به کربن مرکزی آن بستگی دارد.

۳۳۶۰. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

- الف) ساختار نهایی مولکول هموگلوبین، حاصل تاخوره‌گی مارپیچ‌ها و صفحات چهار زیر واحد آن است.
- ب) هر تغییر در ساختار اول پروتئین ذخیره‌گشته اکسیژن، باعث تغییر در فعالیت آن می‌شود.
- ج) با استفاده از پرتوهای X می‌توان جایگاه اتم‌های به کار رفته در دنابسپاراز را تعیین کرد.
- د) اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، فقط یک محل برای اتصال اکسیژن دارد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۳۳۶۱. با ایجاد ساختار سوم پروتئین‌ها، قطعاً

- ۱) پروتئین شکل کروی به خود می‌گیرد.

- ۳) تعدادی از آمینواسیدها در معرض آب قرار می‌گیرند.

۳۳۶۲. گدام گزینه، در ارتباط با شکل مقابله درست است؟

- ۱) نمی‌تواند بخشی از پروتئین دارای جایگاه فعال باشد
- ۲) می‌تواند بخشی از پروتئین انتقال‌دهنده اکسیژن باشد
- ۳) امکان تشکیل پیوندهای بیشتر بین آمینواسیدها وجود ندارد.
- ۴) تغییر در توالی آمینواسیدها نمی‌تواند سبب تغییر شکل آن شود.

۳۳۶۳. گدام گزینه، جملهٔ زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

در پروتئین‌ها، تشکیل ساختار نتیجه است.

- ۲) اول برخلاف سوم - فعالیت مولکولی با جایگاه فعال
- ۴) دوم برخلاف سوم - ویژگی‌های شیمیایی گروه‌های R

۳۳۶۴. در ساختار زنجیرهٔ بتای هموگلوبین انسان سالم،

- ۱) اولین آمینواسید با گروه آمین خود در پیوند پپتیدی شرکت می‌کند.
- ۲) بخش منحصر به فرد آمینواسیدها، در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت نمی‌کند.
- ۳) آمینواسیدی که در پنجمین پیوند پپتیدی شرکت دارد، نمی‌تواند گلوتامیک‌اسید باشد.
- ۴) بین گروه R بعضی آمینواسیدها با هیدروژن بعضی دیگر از آنها پیوند کمتری برقرار می‌شود.

۳۳۶۵. گدام عبارت درست است؟

- ۱) هر پروتئین گیرنده در غشای یاخته، میکروب خاصی را شناسایی می‌دهند.
- ۲) اساس کار دستگاه ایمنی را بعضی از پروتئین‌های گیرنده تشکیل می‌دهند.
- ۳) هورمون‌ها، گروهی از پروتئین‌های تنظیمی محسوب می‌شوند.

(ترکیبیں با ۱۰م و ۱۱م)

۳۳۶۶. گدام گزینه نادرست است؟

- ۱) بعضی آنزیم‌های یاخته‌های عصبی انسان، در غشا فعالیت دارند.
- ۲) یاخته برای درون‌بری همانند بروت‌راتی، به نوعی نوکلوتوتید نیاز دارد.
- ۳) دستورالعمل ساخت پروتئین حمل‌کننده اکسیژن در خون، در چهار نوع ژن قرار دارد.
- ۴) برخی آنزیم‌های گوارشی، همانند آنزیم‌های تنفس یاخته‌ای، درون یاخته فعالیت می‌کنند.

۳۳۶۷. گدام عبارت درست است؟

- ۱) در هر پلی‌پپتید حداقل ۲۰ آمینواسید می‌تواند شرکت کند.
- ۲) در هر زنجیرهٔ پلی‌پپتید، به تعداد آمینواسیدها گروه آمین وجود دارد.

۳۳۶۸. با توجه به سطوح ساختاری مختلف پروتئین‌ها می‌توان بیان داشت که

- ۱) امکان قرار گیری یک ساختار صفحه‌ای بین دو ساختار مارپیچی وجود ندارد.
- ۲) ساختار صفحه‌ای می‌تواند به عنوان مبنای تشکیل ساختار مارپیچی قرار گیرد.
- ۳) انواعی از پیوندهای غیراشتراکی و اشتراکی ممکن است در ایجاد ثبات نسبی در ساختار پروتئینی نقش داشته باشند.
- ۴) پیوندهای اشتراکی، اولین بار در سطحی تشکیل می‌شوند که توالی آمینواسیدها در آن محدودیت دارد.





- ۲۳۶۹. در ساختار پروتئینی که گازهای تنفسی را در خون منتقل می‌کند**
- سوم - برخلاف - با تاخوردگی پیشتر مارپیچ‌ها و صفحات، ساختار سه‌بعدی پروتئین ایجاد می‌شود.
 - اول - برخلاف - چهار نوع زنجیره پلی‌پپتیدی با توالی متفاوت وجود دارد.
 - دوم - همانند - در زنجیره پلی‌پپتیدی ساختار مارپیچی مشاهده می‌شود.
 - چهارم - همانند - عملکرد طبیعی پروتئین به تحویه آرایش زیرواحدها بستگی دارد.

(ترکیبین با دهم)



- ۲۳۷۰. کدام گزینه، جمله زیر را به طور صحیح کامل می‌کند؟**
- ا) پروتئینی که در شکل مقابل دیده می‌شود،
- محل یکسانی برای اتصال اکسیژن و کربن دی‌اکسید دارد.
 - توسط بخش پروتئینی خود به کربن‌مونوکسید متصل می‌شود.
 - در انتقال بیشترین مقدار از اکسیژن محلول در خون دخالت دارد.
 - در ساختار آن یونی وجود دارد که برای فعالیت بعضی از آنزیمهای پروتئینی نیز لازم است.

تسلاط
+ ۸۰٪

۲۳۷۱. چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

در ساختار هموگلوبین،

- الف) سوم - ساختار نهایی هر یک از زیرواحدها بر اثر افزایش تاخوردگی‌ها ایجاد می‌شود.
- ب) دوم - ایجاد ساختارهای مارپیچی و صفحه‌ای، نتیجه برقراری پیوندهای هیدروژنی است.
- ج) چهارم - تشکیل انواعی از پیوندهای اشتراکی، منجر به پیدایش آرایش خاصی از زیرواحدها می‌شود.
- د) سوم - نزدیک شدن گروههای R موجود در بخش هم، قبل از ثبیت ساختار سوم زیرواحدها روی می‌دهد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۳۷۲. کدام گزینه، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

در یک زنجیره پلی‌پپتیدی، هر بخشی از یک آمینواسید که به کربن مرکزی متصل است و

- در تشکیل پیوند پلی‌پپتیدی شرکت می‌کند، توانایی شرکت در نوعی پیوند غیراشتراکی را نیز دارد.
- در صورت تجزیه آمینواسید، منجر به تولید ماده زائد نیتروژن‌دار می‌شود، در ساختار خود اتم کربن دارد.
- ویژگی‌های منحصر به فرد آمینواسید به آن بستگی دارد، قطعاً طوری قرار می‌گیرد که در معرض آب نباشد.
- فقط در آخرین واحد تکرارشونده پلی‌پپتید دیده می‌شود، در ایجاد هیچ یک از ویژگی‌های آمینواسید نقشی ندارد.

۲۳۷۳. کدام گزینه، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

ا) هر پروتئینی که

- پیوندهای غیراشتراکی در ثبیت ساختار آن نقش دارند، قطعاً از یک زنجیره پلی‌پپتیدی تشکیل شده است.
- بین گروههای آمین و کربوکسیل آن پیوند اشتراکی وجود دارد، قطعاً در بین بخش‌هایی از آن پیوند هیدروژنی برقرار است.
- در ساختار آن، الگویی از پیوندهایی هیدروژنی مشاهده می‌شود، تغییر هر یک از آمینواسیدها منجر به تغییر فعالیت آن می‌شود.
- ساختار نهایی آن، حاصل تاخوردن پلی‌پپتید و اتصال بخش‌هایی از آن به هم است، در ساختار دوم خود، بخش مارپیچی یا صفحه‌ای دارد.

(ترکیبین با دهم و یازدهم)

۲۳۷۴. کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

در بدن انسان، پروتئینی که می‌تواند نقش محافظظی داشته باشد،

- تحت تأثیر ترومبین از تغییر پروتئین دیگری به وجود می‌آید
- در بافت استخوانی اسفنجی همانند متراکم یافت می‌شود
- حرکت لغزشی آن بر روی اکتین، سبب کوتاه شدن سارکومرها می‌شود
- در ساختار متصل کننده ماهیچه اسکلتی به استخوان به فراوانی وجود دارد

(ترکیبین با یازدهم)

۲۳۷۵. کدام عبارت درست است؟

۱) هر پروتئین مکمل، می‌تواند با اتصال به غشای میکروب، باعث ایجاد منافذی در آن شود.

۲) منفذ موجود در دیواره مویرگ‌های خونی کلیه، می‌توانند امکان عبور موادی از قبیل گلوکز و هیدروژن را فراهم کنند.

۳) هر پروتئینی که در ایجاد منفذی در غشا نقش دارد، منجر به مرگ برنامه‌ریزی شده یاخته می‌شود.

۴) منفذ غشایی مویرگ‌های خونی عضلات، بعضی پروتئین‌های آهن‌دار را به یاخته‌های ماهیچه‌ای انتقال می‌دهند.

(ترکیبین با دهم)

۲۳۷۶. کدام گزینه برای کامل کردن جمله زیر مناسب است؟

ساختار پروتئین‌ها،

- سوم - بهدلیل وجود انواعی از پیوندهای شبیه‌ای بین رشته‌های پلی‌پپتیدی، قطعاً دارای ثبات نسبی است.
- اول - دلایل پیوندهایی است که آنزیمهای فعال شده بخش کیسه‌ای شکل لوله گوارش، تی توئند آن‌ها را تجزیه کنند.
- چهارم - در اغلب پروتئین‌ها مشاهده می‌شود و در آن هریک از زنجیره‌ها نقشی کلیدی در شکل‌گیری پروتئین دارند.
- دوم - در نتیجه برقراری پیوندهایی بین آمینواسیدها ایجاد می‌شود که در ثبات نسبی ساختار سوم آن‌ها نیز مؤثرند.

۲۳۷۷. چند مورد درباره مولکولی که تغییر شکل آن باعث بروز بیماری کم‌خونی داسی شکل می‌شود، صحیح است؟

الف) شروع شکل‌گیری پیوندهای هیدروژنی آن در سطحی از ساختار اتفاق می‌افتد که مولکول به ثبات نسبی خود می‌رسد.

ب) بروز هر نوع تغییر در توالی واحدهای سازنده آن قطعاً ساختار سه‌بعدی و فعالیت آن را به شدت تغییر می‌دهد.

ج) افزایش کربن‌مونوکسید در هوای دمی، مانع از اتصال اکسیژن به آن می‌شود.

د) همانند گلوبولین‌ها، از پروتئین‌های طبیعی موجود در خوناب انسان محسوب می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۳۳۷۸. کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در سطحی از سطوح ساختاری پروتئین هموگلوبین گه

- ۱) ساختارهای دیگر به آن وابسته است، هر آمینواسید با دو پیوند اشتراکی در زنجیره پلی‌پپتیدی قرار می‌گیرد.
- ۲) هر یک از زنجیرهای آن ساختار مارپیچی ایجاد می‌کند، همه آمینواسیدها در تشکیل پیوندهای هیدروژنی مشارکت می‌کنند.
- ۳) هر زنجیره نقشی کلیدی در ساختار سه‌بعدی پروتئین ایفا می‌کند، امکان رویت پیوند بین الگوهایی از پیوند هیدروژنی وجود ندارد.
- ۴) با تاخور دگری بیشتر زنجیرهای مارپیچی همراه است، گروه‌های R آبگریز آمینواسیدها در تشکیل برهمنکش‌های آبگریز شرکت می‌کنند.

آنزیم‌ها

۳۳۷۹. گروهی از پروتئین‌ها با افزایش اعکان برخوره مولکول‌ها، سرعت واکنش را افزایش می‌دهند. کدام گزینه درباره این مولکول‌ها صحیح است؟

- ۱) انجام هر واکنش در درون یاخته، تیازمند حضور نوعی از آن‌ها است.
- ۲) با افزایش انرژی فعال‌سازی، سرعت واکنش‌ها را بیشتر می‌کنند.
- ۳) نوعی از آن‌ها ضمن آنکافت ATP، پوت‌ها را بین دو سوی غشا جابه‌جا می‌کند.
- ۴) هر یک از آن‌ها که درون یاخته تولید می‌شود، در انجام نوعی واکنش درون یاخته‌ای نقش دارد.

۳۳۸۰. کدام عبارت درست است؟

- ۱) هر ماده سمی، در صورت اتصال به جایگاه فعال آنزیم باعث مرگ می‌شود.
- ۲) بعضی آنزیم‌ها برای فعالیت خود به مواد معدنی مانند ویتامین‌ها نیاز دارند.
- ۳) در ساختار هر ماده‌ای که محلی برای قرار گرفتن پیش‌ماده دارد، نیتروژن یافته می‌شود.
- ۴) هر آنزیم پس از انجام واکنش، مولکول پیش‌ماده را به مولکول‌های فراورده تبدیل می‌کند.

۳۳۸۱. چند مورد، جمله مقابل را به درستی تکمیل می‌کند؟ «هر آنزیم،

- ۱) فقط بر روی یک پیش‌ماده خاص مؤثر است.
- ۲) از نظر شکل جایگاه فعال، با شکل یک پیش‌ماده مطابقت دارد.
- ۳) در یک اسیدیتۀ خاص بهترین فعالیت را دارد.
- ۴) چند مورد، جمله مقابل را به درستی تکمیل می‌کند؟ «هر آنزیم،

آغاز
تازه
+ ۴۰

۳۳۸۲. کدام عبارت از نظر درستی یا نادرستی با سایر عبارت‌ها متفاوت است؟

- ۱) بیشتر آنزیم‌ها در محیطی با اسیدیتۀ ۶ تا ۸ فعالیت می‌کنند.
- ۲) یک آنزیم ممکن است به جایگاه فعال آنزیم دیگری متصل شود.
- ۳) بهترین فعالیت هر پروتئاز دستگاه گوارش انسان، در محیط اسیدی است.
- ۴) آنزیم در هر واکنشی که به عنوان کاتالیزگر شرکت می‌کند، دستخورده باقی می‌ماند.

۳۳۸۳. کدام گزینه، درباره آنزیم‌ها و کوآنزیم‌ها درست است؟

- ۱) بعضی آنزیم‌ها برای فعالیت خود به کوآنزیم‌هایی مانند آهن و مس نیاز دارند.
- ۲) بعضی کوآنزیم‌ها ممکن است در ساختار خود کربن، هیدروژن و اکسیژن داشته باشند.
- ۳) در هر واکنش، مقداری از آنزیم‌ها از بین می‌روند و یاخته مجبور به تولید آنزیم‌های جدید می‌شود.
- ۴) آنزیم‌ها، در همه واکنش‌های شیمیایی بدنه جانداران که شرکت می‌کنند، انرژی فعال‌سازی را کاهش می‌دهند.

۳۳۸۴. گروهی از مولکول‌های زیستی در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند. کدام گزینه درباره همه این مولکول‌ها صحیح است؟

- ۱) پروتئین‌هایی هستند که قطعاً ساختاری بدون شاخه دارند.
- ۲) بر روی یک یا چند پیش‌ماده خاص مؤثر هستند.
- ۳) فعالیت خود را در درون یا خارج یاخته انجام می‌دهند.
- ۴) در دمای بالاتر از ۳۷ درجه سانتی‌گراد شکل غیرطبیعی پیدا می‌کنند.

۳۳۸۵. کدام یک از عبارت‌های زیر در ارتباط با آنزیم‌ها به درستی بیان شده است؟

- ۱) هر آنزیم برای فعالیت به موادی مانند ویتامین‌ها نیاز دارد که به آن‌ها کوآنزیم گفته می‌شود.
- ۲) هر ماده سمی موجود در محیط می‌تواند جایگاه فعال یک آنزیم را اشغال کند و مانع از فعالیت آن شود.
- ۳) با کاهش غلظت پیش‌ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد، همواره سرعت تولید فراورده کاهش می‌یابد.
- ۴) به طور حتم هر آنزیم در یک pH ویژه بهترین فعالیت را دارد که به آن pH بهینه می‌گویند.

۳۳۸۶. انواعی از مولکول‌ها در دهای پایین غیرفعال شده و با بازگشت دما به حالت طبیعی دوباره فعال می‌شوند. کدام گزینه درباره همه انواع این مولکول‌ها درست است؟

- ۱) بهدلیل نحوه خاص فعالیت آن‌ها، هیچ‌گاه از بین نمی‌روند.
- ۲) سرعت فعالیت آن‌ها در هر شرایطی مشخص و ثابت است.
- ۳) نوع، ترتیب و تعداد آمینواسیدهای آن‌ها شکل فضایی‌شان را تعیین می‌کند.
- ۴) مقدار بسیار کمی از آن‌ها برای انجام میزان زیادی از فعالیتشان کافی است.

۳۳۸۷. کدام گزینه، درباره مایه پنیر صحیح است؟

- ۱) شامل کاتالیزورهای زیستی است که به منظور دلمه کردن پروتئین شیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- ۲) نام عمومی آنزیم‌هایی است که به کمک روش‌های مهندسی زیستی در ریز جانداران تولید می‌شوند.
- ۳) حاوی ترکیباتی است که به طور سنتی از شیر جانورانی مثل گوسفت و گلو به دست می‌آیند.
- ۴) حاوی ترکیباتی است که به طور طبیعی، گیاهان برخلاف جانوران قادر به تولید آن نیستند.