

# بخش ۵ قدرت اسیدی محلول‌ها و pH

## راه‌های تشخیص pH محلول

خاصیت اسیدی یا بازی یک محلول، به وجود یون‌های  $H^+$  و  $OH^-$  در محلول موردنظر نسبت داده شده و از مقیاس pH نیز برای مقایسه میزان اسیدی با بازی بودن محلول‌های مختلف استفاده می‌شود. یکی از راه‌های به دست آوردن pH محلول‌های مختلف، استفاده از کاغذ pH است. این کاغذ در مجاورت با محلول‌های اسیدی یا بازی تغییر رنگ می‌دهد و این تغییر رنگ، معیاری برای تشخیص اسیدی یا بازی بودن محلول است. در واقع رنگی که این کاغذ در یک محلول به خود می‌گیرد، نشان‌دهنده pH تقریبی آن محلول است. این کاغذ در محلول‌هایی با خاصیت اسیدی (pH کمتر از ۷) به رنگ قرمز و در محلول‌هایی با خاصیت بازی (pH بزرگ‌تر از ۷) به رنگ آبی درمی‌آید. استفاده از pH سنج‌های دیجیتالی نیز یکی از روش‌های دقیق به دست آوردن pH محلول‌ها است.

### چندنگنه

محتویات موجود در هر عضو از بدن انسان، براساس وظیفه و کارکرد آن عضو، pH خاصی دارند. به عنوان مثال، pH بزاق تقریباً برابر ۶ و pH شیرۀ معده تقریباً برابر ۱/۷ بوده و این محلول‌ها خاصیت اسیدی دارند. در طرف مقابل، pH خون و محتویات روده به ترتیب برابر ۷/۴ و ۸/۵ است؛ پس این محیط‌ها خاصیت بازی دارند.

از کلسیم اکسید (آهک) به عنوان یک اکسید فلزی با خاصیت بازی، برای کنترل میزان pH آب دریاچه‌ها و خاک استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در صورت کاهش pH آب دریاچه‌ها، کلسیم اکسید را به کمک هلیکوپتر بر روی آب آن‌ها می‌پاشند تا pH آب افزایش پیدا کند.

شیر ترش شده، محتوی لاکتیک اسید بوده و به خاطر وجود این ماده، pH آن کمتر از ۷ است و کاغذ pH در مجاورت با آن قرمز رنگ می‌شود. *آله یارتون باشه، از این ماده برای تولید پلی‌لاکتیک اسید استفاده می‌شه.*

## مفهوم pH محلول‌ها

برای سنجش میزان اسیدی بودن محلول‌ها، باید غلظت یون  $H^+$  موجود در آن‌ها را تعیین کنیم. از آن‌جا که غلظت یون هیدروژن در اغلب محلول‌های آبی بسیار کوچک بوده و کارکردن با آن بسیار پیچیده است، برای پرهیز از بیان غلظت‌های کم و بسیار کم یون هیدروژن، می‌توان از کمیت pH استفاده کرد که اعدادی به مراتب ساده‌تر و قابل فهم‌تر ارائه می‌دهد. pH محلول‌های آبی در دمای اتاق، با اعدادی در گستره ۰ تا ۱۴ بیان می‌شود و به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$pH = -\log[H^+]$$

برای محاسبه pH محلول‌های مختلف، باید از غلظت  $H^+$  در آن محلول‌ها لگاریتم بگیریم؛ پس حتماً قواعد مربوط به لگاریتم را به خوبی بلد باشید. این قوانین عبارت هستند از:

$$\log a^n = n \cdot \log a \quad \log a \cdot b = \log a + \log b \quad \log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$

*طراحان مترم‌نگار، مقدار لگاریتم اعداد مختلف را در سؤالات مربوط به محاسبه pH محلول‌ها نمی‌دهند؛ پس حتماً مقدار لگاریتم عددهای زیر را به خاطر بسپارید:*

$$\log 2 = 0.3 \quad \log 3 = 0.5 \quad \log 5 = 0.7 \quad \log 7 = 0.85$$

### چندنگنه

به کمک رابطه روبه‌رو، می‌توان غلظت یون هیدروژن موجود در یک محلول را از روی مقدار pH آن محلول محاسبه کرد:  $[H^+] = 10^{-pH}$


مقدار pH یک محلول، فاقد یکان است. با افزایش غلظت یون  $H^+$  در یک محلول، خاصیت اسیدی آن محلول افزایش پیدا کرده و مقدار pH آن کاهش پیدا می‌کند؛ پس می‌توان گفت غلظت یون  $H^+$  در یک محلول، با pH آن محلول رابطه عکس دارد.

**نست** pH یک محلول برابر ۲ و pH محلول دیگری برابر ۸ است. غلظت یون  $H^+$  در محلول دوم، چند برابر محلول اول است؟

$$10^{-6} \quad (1) \quad 4 \times 10^2 \quad (2) \quad 10^{+6} \quad (3) \quad 2/5 \times 10^{-2} \quad (4)$$

**پاسخ** گزینه «۱» ابتدا غلظت یون  $H^+$  را در هر یک از این محلول‌ها به دست آورده و مقادیر حاصل را با هم مقایسه می‌کنیم.

$$[H^+] = 10^{-pH} \begin{cases} \text{محلول اول: } [H^+] = 10^{-2} \\ \text{محلول دوم: } [H^+] = 10^{-8} \end{cases} \Rightarrow \frac{\text{غلظت } H^+ \text{ در محلول دوم}}{\text{غلظت } H^+ \text{ در محلول اول}} = \frac{10^{-8}}{10^{-2}} = 10^{-6}$$



**نکته** تصویر مقابل، نمایی از یون‌های هیدروژن موجود در دو محلول هم‌حجم را نشان می‌دهد. در این شرایط، pH محلول A به اندازه ..... واحد، ..... از pH محلول B است.

- (۱) ۰/۳ - کم‌تر  
(۲) ۰/۶ - کم‌تر  
(۳) ۰/۳ - بیشتر  
(۴) ۰/۶ - بیشتر

**پاسخ** گزینه «۴» اگر غلظت یون  $H^+$  در محلول A برابر با  $M \text{ mol.L}^{-1}$  باشد، با توجه به تصاویر داده‌شده، غلظت این یون در محلول B برابر  $4M \text{ mol.L}^{-1}$  می‌شود.

$$pH_A - pH_B = (-\log[H_A^+]) - (-\log[H_B^+]) = (\log[H_B^+]) - (\log[H_A^+]) \xrightarrow{\log \frac{a}{b} = \log a - \log b} pH_A - pH_B = \log \frac{[H_B^+]}{[H_A^+]}$$

$$= \log \frac{4M}{M} = \log 4 = \log 2^2 = 2 \log 2 = 2 \times 0/3 = 0/6$$

چون غلظت یون  $H^+$  در محلول A کم‌تر از محلول B است، پس این محلول خاصیت اسیدی کم‌تر و pH بیشتری نسبت به محلول B دارد.

### محاسبه pH محلول اسیدهای قوی و اسیدهای ضعیف

همان‌طور که می‌دانیم، در محلول اسیدهای قوی، کل مولکول‌های اسید حل‌شده یونش پیدا کرده و به یون‌هایی با بار مثبت و منفی تبدیل می‌شوند در حالی که در محلول اسیدهای ضعیف، فقط مقدار کمی از مولکول‌های حل‌شده یونش پیدا می‌کنند و شمار زیادی از مولکول‌ها، به صورت دست‌نخورده باقی می‌مانند. برای محاسبه غلظت یون هیدروژن در محلولی از یک اسید تک‌پروتون‌دار با غلظت مولی  $M$  و درجه یونش  $\alpha$ ، می‌توانیم از رابطه مقابل استفاده کنیم:

واضح است که اگر محلول موردنظر مربوط به یک اسید قوی باشد، مقدار  $\alpha$  برای آن اسید برابر یک بوده و غلظت یون هیدروژن در این محلول، با غلظت اسید حل‌شده در آن برابر است.

**نکته** ۲ مول گاز هیدروژن کلرید را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول حاصل را با اضافه کردن آب خالص، به ۱۰ L می‌رسانیم. pH محلول حاصل

کدام است؟

- (۱) ۰/۳  
(۲) ۱/۳  
(۳) ۰/۷  
(۴) ۰/۵

**پاسخ** گزینه «۳» گام اول، ابتدا غلظت HCl را در محلول نهایی به دست آورده و پس از آن، غلظت یون هیدروژن را محاسبه می‌کنیم.

$$HCl \text{ مولی} = \frac{HCl \text{ مول}}{\text{لیتر محلول}} = \frac{2 \text{ mol}}{10 \text{ L}} = 0/2 \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow [H^+] = M \cdot \alpha = 0/2 \times 1 = 0/2 \text{ mol.L}^{-1}$$

گام دوم: با توجه به غلظت یون هیدروژن، pH محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$pH = -\log [H^+] = -\log \frac{2}{10} = -(\log 2 - \log 10) = -(0/3 - 1) = 0/7$$

**نکته** در دمای معین، درجه یونش اسید HA در محلول ۰/۴ مولار آن، برابر ۰/۲۵ است. pH این محلول در دمای موردنظر کدام است؟

- (۱) ۱  
(۲) ۲  
(۳) ۳  
(۴) ۴

**پاسخ** گزینه «۲» ابتدا غلظت یون هیدروژن را به دست آورده و پس از آن، pH محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$[H^+] = M \cdot \alpha = 0/4 \times 0/25 = 0/1 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$pH = -\log [H^+] = -\log 0/1 = 2$$

### محاسبه pH آب خالص

براساس آزمایش‌های انجام‌شده، نمونه‌ای از آب خالص که فاقد هر گونه حل‌شونده‌ای است، رسانایی الکتریکی ناچیزی دارد که وجود آن را به حضور مقدار بسیار اندکی از یون‌های هیدروکسید ( $OH^-$ ) و هیدروژن ( $H^+$ ) در آب خالص نسبت می‌دهند. یون‌های موردنظر، براساس واکنش:

$$H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$$

در آب تولید می‌شوند. ثابت تعادل این واکنش به صورت زیر محاسبه می‌شود:



آزمایش‌های مختلف نشان می‌دهد که مقدار  $K_W$  در دمای اتاق ( $25^\circ C$ )، برابر با  $10^{-14} \text{ mol}^2 \cdot \text{L}^{-2}$  است که این مقدار، همانند ثابت تعادل سایر واکنش‌ها، فقط و فقط تابع دما است.




از آن جا که در آب خالص، همواره غلظت یون‌های  $H^+$  و  $OH^-$  با هم برابر هستند، خواهیم داشت:

$$K_W = [H^+][OH^-] = 10^{-14} \xrightarrow{[H^+] = [OH^-]} 10^{-14} = [H^+]^2 \Rightarrow [H^+] = 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$$

با توجه به  $[H^+]$  در آب خالص در دمای  $25^\circ C$ ،  $pH$  آن به صورت مقابل به دست می‌آید:

$$pH = -\log [H^+] = -\log 10^{-7} = 7$$

**چندنگه**



با توجه به رابطه  $K_W$ ، پی می‌بریم که غلظت یون‌های  $H^+$  و  $OH^-$  در یک محلول، با هم رابطه عکس دارند. به عبارتی، اگر غلظت یون  $H^+$  در یک محلول افزایش پیدا کند، غلظت یون  $OH^-$  به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند تا همواره رابطه  $10^{-14} = [H^+][OH^-]$  برقرار باشد. نمودار مقابل، روند تغییر غلظت یون هیدروژن موجود در یک محلول را براساس تغییر غلظت یون هیدروکسید موجود در آن نشان می‌دهد:

از آن جا که غلظت یون  $H^+$  با غلظت یون  $OH^-$  در آب خالص برابر است، پس آب خالص نه خاصیت اسیدی دارد و نه خاصیت بازی.

در یک محلول اسیدی یا بازی، به کمک رابطه  $10^{-14} = [H^+][OH^-]$ ، می‌توان غلظت هر یک از یون‌های  $H^+$  یا  $OH^-$  را با داشتن غلظت مولی یون دیگر به دست آورد.

**نست** در محلولی از هیدروکلریک اسید با  $pH = 2$  در دمای  $25^\circ C$ ، غلظت مولی یون  $H^+$  چند برابر غلظت مولی یون  $OH^-$  است؟

گزینه ۱)  $10^{-10}$       گزینه ۲)  $10^0$       گزینه ۳)  $10^{-12}$       گزینه ۴)  $10^{12}$

**پاسخ** گزینه «۲» گام اول: ابتدا با توجه به  $pH$  محلول، غلظت یون هیدروژن موجود در آن را محاسبه می‌کنیم.

$$[H^+] = 10^{-pH} \Rightarrow [H^+] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

گام دوم: با توجه به غلظت  $H^+$  و مقدار  $K_W$ ، ابتدا غلظت مولی یون  $OH^-$  را به دست آورده و مقادیر حاصل را با هم مقایسه می‌کنیم.

$$K_W = 10^{-14} = [H^+][OH^-] \Rightarrow 10^{-14} = 10^{-2} \times [OH^-] \Rightarrow [OH^-] = 10^{-12} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\frac{[H^+]}{[OH^-]} = \frac{10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}}{10^{-12} \text{ mol.L}^{-1}} = 10^{10}$$

## محاسبه pH محلول‌های بازی

در محلول‌های بازی، غلظت یون هیدروکسید بیشتر از یون هیدرونیوم است ( $[OH^-] > [H^+]$ ). برای محاسبه  $pH$  این محلول‌ها، ابتدا باید غلظت یون  $OH^-$  موجود در محلول را به کمک رابطه  $M.\alpha$  به دست بیاوریم و پس از آن، به کمک رابطه  $10^{-14} = K_W = [H^+][OH^-]$ ، غلظت یون هیدروژن را محاسبه کنیم. در مرحله آخر نیز با توجه به غلظت یون هیدروژن،  $pH$  محلول را محاسبه می‌کنیم.

**چندنگه**

برای محاسبه  $pH$  محلول‌های بازی می‌توانیم از رابطه مقابل کمک بگیریم:

$$pH = -\log [H^+] = -\log \frac{10^{-14}}{[OH^-]} = \log \frac{[OH^-]}{10^{-14}}$$

برای به دست آوردن غلظت یون هیدروکسید در محلول‌های بازی می‌توانیم از رابطه مقابل استفاده کنیم:

$$[OH^-] = 10^{pH-14}$$

**نست** ۴۰ گرم سدیم هیدروکسید جامد را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را با اضافه کردن آب خالص، به ۲ L می‌رسانیم.  $pH$  محلول حاصل

از این فرایند کدام است؟ ( $Na = 23, O = 16, H = 1: \text{g.mol}^{-1}$ )

گزینه ۱)  $13/3$       گزینه ۲)  $13/7$       گزینه ۳)  $12/3$       گزینه ۴)  $12/7$

**پاسخ** گزینه «۲» گام اول: با توجه به جرم  $NaOH$  حل شده و حجم محلول، غلظت یون  $OH^-$  را محاسبه می‌کنیم.

$$? \text{ mol NaOH} = 40 \text{ g NaOH} \times \frac{1 \text{ mol NaOH}}{40 \text{ g NaOH}} = 1 \text{ mol}$$

$$\text{غلظت مولی محلول} = \frac{\text{مول NaOH}}{\text{لیتر محلول}} = \frac{1 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0.5 \text{ mol.L}^{-1} \xrightarrow{\alpha=1} [OH^-] = [NaOH] = 0.5 \text{ mol.L}^{-1}$$

گام دوم: با استفاده از مقدار  $K_W$ ، ابتدا غلظت یون هیدروژن و پس از آن، مقدار  $pH$  محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$K_W = [OH^-][H^+] = 10^{-14} \Rightarrow 10^{-14} = 0.5 \times [H^+] \Rightarrow [H^+] = 2 \times 10^{-14}$$

$$pH = -\log [H^+] = -\log 2 \times 10^{-14} = -(\log 2 + \log (10^{-14})) = -(0.3 - 14) = 13.7$$

به راه دیگه: برای محاسبه  $pH$  این محلول، از روش روبه‌رو هم می‌توانیم استفاده کنیم:

$$pH = \log \frac{[OH^-]}{10^{-14}} \Rightarrow pH = \log \left( \frac{0.5}{10^{-14}} \right) = 13.7$$

**مسئله** اگر درجه یونش آمونیاک در محلولی از آن با  $\text{pH} = 10$ ، برابر با  $1/10$  باشد، غلظت مولی آمونیاک در محلول موردنظر برابر با چند  $\text{mol.L}^{-1}$  است؟


- ۱)  $10^{-5}$       ۲)  $10^{-4}$       ۳)  $10^{-3}$       ۴)  $10^{-2}$

**پاسخ** گزینه «۳» گام اول، با توجه به  $\text{pH}$ ، ابتدا غلظت یون  $\text{H}^+$  و پس از آن غلظت یون  $\text{OH}^-$  را محاسبه می‌کنیم.

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow K_W = 10^{-14} = [\text{H}^+][\text{OH}^-] \Rightarrow 10^{-14} = 10^{-10} \times [\text{OH}^-] \Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

یه راه دیگه: برای محاسبه غلظت یون هیدروکسید، از روش زیر هم می‌توانیم استفاده کنیم:

$$[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} \Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{10-14} = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$



گام دوم: معادله یونش آمونیاک، به صورت مقابل است:

با توجه به غلظت یون  $\text{OH}^-$  در محلول و درجه یونش آمونیاک، غلظت مولی این ماده را محاسبه می‌کنیم.

$$[\text{OH}^-] = M \cdot \alpha = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow \text{درجه یونش} \times \text{غلظت باز} = 10^{-4} \Rightarrow 10^{-4} = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \times 0.1$$

## تغییر غلظت محلول اسیدها و بازها

اگر محلول یک اسید را با افزودن آب خالص به آن رقیق‌تر کنیم، غلظت یون هیدروژن در آن کاهش یافته و  $\text{pH}$  محلول افزایش پیدا می‌کند (به عدد ۷ نزدیک‌تر می‌شود) و به همین ترتیب، اگر محلول یک باز را با اضافه کردن آب خالص به آن رقیق‌تر کنیم، غلظت یون هیدروکسید در محلول کاهش یافته و  $\text{pH}$  محلول نیز کم‌تر می‌شود (به عدد ۷ نزدیک‌تر می‌شود).

برخلاف فرایند رقیق‌سازی، اگر غلظت اسید یا باز موجود در یک محلول را افزایش دهیم،  $\text{pH}$  محلول موردنظر از عدد ۷ دورتر می‌شود.

### چند نکته

- ◀ اگر محلول یک اسید قوی و یا یک باز قوی را  $n$  مرتبه رقیق کنیم (حجم محلول را با اضافه کردن آب خالص به آن،  $n$  برابر کنیم)، این  $\text{pH}$  محلول به اندازه  $\log n$  واحد به  $\text{pH}$  ناحیه خنثی ( $\text{pH} = 7$ ) نزدیک‌تر می‌شود.
- ◀ اگر محلول یک اسید قوی و یا یک باز قوی را  $n$  مرتبه غلیظ کنیم (با افزایش مقدار اسید و یا کاهش مقدار آب موجود در محلول)، این  $\text{pH}$  محلول به اندازه  $\log n$  واحد از  $\text{pH}$  ناحیه خنثی ( $\text{pH} = 7$ ) دورتر می‌شود.
- ◀ اگر محلول یک اسید ضعیف و یا یک باز ضعیف را  $n$  مرتبه رقیق کنیم، این  $\text{pH}$  محلول به اندازه کم‌تر از  $\log n$  واحد به  $\text{pH}$  ناحیه خنثی ( $\text{pH} = 7$ ) نزدیک‌تر می‌شود.
- ◀ اگر محلول یک اسید ضعیف و یا یک باز ضعیف را  $n$  مرتبه غلیظ کنیم، این  $\text{pH}$  محلول به اندازه کم‌تر از  $\log n$  واحد از  $\text{pH}$  ناحیه خنثی ( $\text{pH} = 7$ ) دورتر می‌شود.

**مسئله** به  $10 \text{ mL}$  محلول  $\text{HCl}$  با  $\text{pH} = 2$ ،  $90 \text{ mL}$  آب خالص اضافه می‌کنیم.  $\text{pH}$  محلول حاصل از این فرایند کدام است؟

- ۱) ۱      ۲)  $1/7$       ۳)  $2/3$       ۴) ۳

**پاسخ** گزینه «۴» با افزودن  $90 \text{ mL}$  آب به این محلول، حجم محلول  $10$  برابر شده و غلظت اسید موجود در آن،  $10$  مرتبه رقیق‌تر می‌شود؛ پس  $\text{pH}$

این محلول به اندازه  $\log 10 = 1$  واحد به  $\text{pH}$  ناحیه خنثی نزدیک‌تر شده و از  $2$  به  $3$  می‌رسد.

یه راه دیگه: برای محاسبه  $\text{pH}$  محلول نهایی، می‌توانیم ابتدا غلظت یون هیدروژن را در محلول اولیه محاسبه کنیم و پس از آن، با توجه به تغییر حجم حلال، غلظت یون هیدروژن را در محلول نهایی به دست بیاوریم. در مرحله بعد، با گرفتن لگاریتم از غلظت یون هیدروژن، می‌توانیم  $\text{pH}$  محلول را محاسبه کنیم.

**مسئله** به  $20 \text{ mL}$  محلول سدیم هیدروکسید با غلظت  $0.2 \text{ mol.L}^{-1}$ ، چند میلی‌لیتر آب خالص اضافه کنیم تا  $\text{pH}$  محلول به  $12$  برسد؟

- ۱)  $380$       ۲)  $180$       ۳)  $280$       ۴)  $480$

**پاسخ** گزینه «۱» گام اول، ابتدا غلظت یون هیدروژن را محاسبه کرده و پس از آن،  $\text{pH}$  محلول را به دست می‌آوریم.

$$[\text{OH}^-] = M \cdot \alpha = 0.2 \times 1 = 0.2 \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow K_W = 10^{-14} = [\text{OH}^-][\text{H}^+] \Rightarrow 10^{-14} = 0.2 \times [\text{H}^+] \Rightarrow [\text{H}^+] = 5 \times 10^{-14}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] \Rightarrow \text{pH} = -\log (5 \times 10^{-14}) = -(\log 5 + \log 10^{-14}) = -(0.7 - 14) = 13.3$$

گام دوم: برای آن که  $\text{pH}$  محلول از  $13.3$  به  $12$  برسد، محلول موردنظر را باید به اندازه  $10^{13.3-12} = 10^{1.3} = 10^1 \times 10^{0.3} = 10 \times 2 = 20$  (بزرگ‌تر از  $10^{1/3}$ ) برابر رقیق کنیم. برای این منظور، باید  $380 \text{ mL}$  آب خالص را به محلول اضافه کنیم تا حجم نهایی آن به  $400 \text{ mL}$  برسد.

یه راه دیگه: می‌توانستیم به جای استفاده از قوانین رقیق‌سازی محلول‌ها، ابتدا غلظت یون  $\text{OH}^-$  موجود در محلولی از  $\text{NaOH}$  با  $\text{pH} = 12$  را به دست بیاوریم و پس از آن، با توجه به غلظت اولیه این یون، حجم آب مورد نیاز برای رقیق کردن محلول را محاسبه کنیم.





**تست** اگر غلظت نیتریک اسید حل شده در یک محلول را ۴ برابر کنیم، pH این محلول به اندازه چند واحد تغییر می‌کند؟

- ۱) ۰/۳      ۲) ۰/۶      ۳) ۲      ۴) ۱/۲

**پاسخ** گزینه «۲» طی این فرایند، محلول نیتریک اسید اولیه به اندازه ۴ مرتبه غلیظ‌تر شده است؛ پس pH آن به اندازه  $\log 4 = \log 2^2 = 2 \times 0.3 = 0.6$  واحد از pH منطقه خنثی (pH = 7) دورتر می‌شود.

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

### مفهوم pH محلول‌ها و راه‌های محاسبه آن

۱۷۴- چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

- (آ) از مقیاس pH برای مقایسه خاصیت اسیدی محلول‌های مختلف استفاده می‌شود.  
 (ب) باران‌های معمولی، شامل نیتریک اسید و سولفوریک اسید بوده و pH آن‌ها کم‌تر از ۷ است.  
 (پ) رنگی که کاغذ pH در یک محلول به خود می‌گیرد، نشان‌دهنده مقدار pH تقریبی آن محلول خواهد بود.  
 (ت) شیر ترش شده حاوی مقداری لاکتیک اسید بوده و به همین خاطر، pH آن کم‌تر از ۷ است.
- ۱) ۱      ۲) ۲      ۳) ۳      ۴) ۴

۱۷۵- کدام یک از مطالب زیر درست است؟

- (۱) گل‌های ادیسی در خاک‌هایی که رنگ کاغذ pH را به قرمز تغییر می‌دهند، به رنگ سرخ شکوفا می‌شوند.  
 (۲) pH محیط درون معده انسان، برخلاف pH محتویات موجود در روده کوچک، کم‌تر از ۷ است.  
 (۳) مقدار pH نمونه‌ای از شیر معده که غلظت یون هیدرونیوم در آن برابر  $5 \times 10^{-3}$  مولار باشد، برابر ۱/۷ است.  
 (۴) صابون‌ها، خاصیت اسیدی داشته و طی انحلال آن‌ها در آب خالص، pH محلول به کم‌تر از ۷ کاهش پیدا می‌کند.

۱۷۶- چند مورد از عبارات زیر درست است؟

- (آ) هیدرویدیک اسید، برخلاف نیتریک اسید طی یک واکنش تعادلی در آب یونش پیدا می‌کند.  
 (ب) pH خون انسان، همانند محلول حاصل از انحلال سدیم اکسید در آب، بزرگ‌تر از ۷ است.  
 (پ) برای پرهیز از بیان غلظت‌های بسیار کم یون هیدرونیوم در یک محلول، می‌توان از کمیت pH استفاده کرد.  
 (ت) محلول‌های سفیدکننده از نظر شیمیایی فعال بوده و علاوه بر آن، خاصیت خوردگی نیز دارند.
- ۱) ۱      ۲) ۲      ۳) ۳      ۴) ۴

۱۷۷- کدام یک از مطالب زیر درست است؟

- (۱) اگر در محلول A غلظت یون هیدرونیوم دو برابر محلول B باشد، pH این محلول ۰/۵ واحد کم‌تر از محلول B می‌شود.  
 (۲) در شرایط یکسان، یک قطعه از فلز منیزیم با محلول نیتریک اسید با شدت بیشتری نسبت به محلول نیتریک اسید واکنش می‌دهد.  
 (۳) در محلول فورمیک اسید، رابطه  $[HCOO^-] > [H^+] > [HCOOH]$  بین گونه‌های موجود در محلول برقرار است.  
 (۴) میان محلول‌هایی با غلظت برابر از هیدروسیانیک اسید و هیدروبرمیک اسید، pH محلول هیدروسیانیک اسید بیشتر است.

۱۷۸- چند مورد از عبارات داده شده نادرست است؟

- (آ) برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی صابون مراغه، به این صابون انواع نمک‌های فسفات افزوده می‌شود.  
 (ب) رسانایی الکتریکی محلول ۱ مولار نیتریک اسید، کم‌تر از رسانایی الکتریکی محلول ۱ مولار استیک اسید است.  
 (پ) هر اندازه صابون بتواند مقدار بیشتری از آلاینده و چربی را بزدايد، قدرت پاک‌کنندگی بیشتری دارد.  
 (ت) غلظت مولی یون هیدرونیوم در یک محلول بازی با  $pH = 11/5$ ، برابر با  $3 \times 10^{-11}$  مول بر لیتر است.
- ۱) ۱      ۲) ۲      ۳) ۳      ۴) ۴

### محاسبه pH محلول اسیدهای قوی و ضعیف

۱۷۹- حجم‌های برابری از گازهای دی‌نیتروژن پنتاکسید و هیدروژن کلرید را در شرایط یکسان به طور مجزا در یک لیتر آب حل می‌کنیم. اگر طی انحلال این گازها، حجم محلول‌های موردنظر بدون تغییر باقی بماند، pH محلول حاصل از انحلال گاز هیدروژن کلرید، به اندازه ..... واحد ..... از محلول دیگر است.

- ۱) کم‌تر      ۲) ۰/۳ - کم‌تر      ۳) ۱ - بیشتر      ۴) ۰/۳ - بیشتر



۱۸۰- ۸/۹۶ لیتر گاز هیدروژن برمیید را در شرایط استاندارد در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را با اضافه کردن آب خالص به ۱۶۰۰ میلی لیتر می‌رسانیم. pH محلول حاصل از این فرایند کدام است؟

- ۰/۱۶ (۱)      ۰/۲ (۲)      ۰/۴ (۳)      ۰/۶ (۴)

۱۸۱- اگر درصد یونش اسید HA برابر با ۴٪ و pH یک نمونه دو لیتری از محلول آن برابر ۳/۷ باشد، چند لیتر از گاز HA در شرایط STP در این محلول حل شده است؟

- ۰/۲۲۴ (۱)      ۲/۲۴ (۲)      ۰/۱۱۲ (۳)      ۱/۱۲ (۴)

۱۸۲- مقدار pH یک نمونه محلول هیدروفلوئوریک اسید با چگالی  $1 \text{ g.mL}^{-1}$  که غلظت یون فلئورید در آن برابر  $570 \text{ ppm}$  می‌باشد، کدام است؟ ( $F = 19 \text{ g.mol}^{-1}$ )

- ۱/۷ (۱)      ۱/۵ (۲)      ۲/۳ (۳)      ۲/۵ (۴)

۱۸۳- کدام یک از مطالب زیر درست است؟

(۱) هر ماده شیمیایی که در آب محلول باشد، نمی‌تواند در چربی‌ها حل بشود.

(۲) نسبت میان شمار اتم‌ها به شمار عناصر در فرمول مولکولی منیزیم استات برابر ۳ است.

(۳) اگر pH محلول  $0.1 \text{ mol.L}^{-1}$  اسید HA برابر با ۴ باشد، درجه یونش این اسید برابر  $0.1$  می‌شود.

(۴) گاز حاصل از واکنش میان مخلوط سدیم هیدروکسید و آلومینیم با آب، در واکنش تجزیه آب‌اکسیژنه نیز تولید می‌شود.

۱۸۴- pH تقریبی محلول  $0.1 \text{ mol.L}^{-1}$  اسید ضعیف HA با  $K_a = 10^{-5}$ ، کدام است؟ (سراسری ریاضی ۹۱)

- ۴ (۱)      ۳ (۲)      ۲ (۳)      ۵ (۴)

۱۸۵- مقدار  $K_a$  برای بنزوئیک اسید، برابر با  $5 \times 10^{-5}$  است. برای تهیه نیم لیتر محلول بنزوئیک اسید با  $\text{pH} = 2.7$ ، به چند گرم از این اسید نیاز داریم؟ ( $O = 16, C = 12, H = 1; \text{g.mol}^{-1}$ )

- ۴/۸۸ (۱)      ۴/۲۴ (۲)      ۹/۷۶ (۳)      ۸/۴۸ (۴)

۱۸۶- نیم لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 5$  در اختیار داریم. در مرحله اول، با حل کردن  $m_1$  گرم گاز هیدروژن کلرید در محلول، pH آن را به ۳ می‌رسانیم و پس از آن، در مرحله دوم با حل کردن  $m_2$  گرم گاز هیدروژن کلرید در محلول، pH آن را به یک می‌رسانیم. چنانچه انحلال  $\text{HCl(g)}$ ، تغییری در حجم محلول ایجاد نکرده باشد، مقدار  $m_1$  چند برابر مقدار  $m_2$  است؟ ( $\text{Cl} = 35.5, \text{H} = 1; \text{g.mol}^{-1}$ )

- ۰/۱ (۱)      ۰/۰۹ (۲)      ۰/۱۱ (۳)      ۰/۰۱ (۴)

۱۸۷- pH محلول  $0.1 \text{ mol.L}^{-1}$  اسید ضعیف HA در دمای  $25^\circ \text{C}$  برابر  $2.7$  است. ثابت یونش اسید موردنظر در این دما برابر با چند  $\text{mol.L}^{-1}$  است؟

- $4 \times 10^{-4}$  (۱)       $2 \times 10^{-3}$  (۲)       $5 \times 10^{-4}$  (۳)       $2 \times 10^{-4}$  (۴)

۱۸۸- بر اثر حل شدن چند مول اسید HA که  $K_a$  آن برابر یک است، در یک لیتر آب مقطر، pH محلول به صفر می‌رسد؟ (سراسری تهری ۹۳)

- ۱ (۱)      ۲ (۲)      ۳ (۳)      ۴ (۴)

۱۸۹- با توجه به داده‌های جدول زیر، درباره اسیدهای ضعیف HA و HB، مقدار x چند برابر b است؟ (سراسری ریاضی فارغ از کشور ۹۱)

اسید ضعیف	pH	درصد تفکیک	مولاریته
HA	a	۷/۲٪	b
HB	a+1	۱/۸٪	x

- ۰/۳ (۱)      ۰/۶ (۲)      ۰/۴ (۳)      ۰/۵ (۴)

۱۹۰- برای تهیه محلولی از اسید ضعیف HA با  $K_a = 5 \times 10^{-5}$  که pH آن با pH محلول  $0.1 \text{ mol.L}^{-1}$  هیدروکلریک اسید برابر باشد، غلظت مولی آن تقریباً باید چند برابر مولاریته محلول هیدروکلریک اسید باشد؟ (سراسری تهری ۹۰)

- ۴۰ (۱)      ۵۰ (۲)      ۱۰۰ (۳)      ۲۰۰ (۴)

۱۹۱- گاز دی‌نیتروژن پنتاکسید، براساس معادله  $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{NO}_3^-(\text{aq}), \Delta H = -76 \text{ kJ}$ ، در آب حل می‌شود. مقداری از این گاز را در حجمی از آب حل کرده و پس از آن، حجم محلول موردنظر را در دمای  $25^\circ \text{C}$  با اضافه کردن آب خالص به ۲ لیتر می‌رسانیم. اگر طی این فرایند،  $30/4 \text{ kJ}$  گرما آزاد شده باشد، pH محلول حاصل کدام است؟

- ۰/۴ (۱)      ۰/۳ (۲)      ۰/۷ (۳)      ۱/۳ (۴)

۱۹۲-  $0.1 \text{ g}$  گرم از گازهای هیدروژن برمیید و هیدروژن سیانید را به طور مجزا در یک لیتر از آب خالص حل می‌کنیم. چنانچه مقدار  $K_a$  برای محلول هیدروسیانیک اسید برابر  $4/32 \times 10^{-10}$  باشد و انحلال این ترکیب‌ها تغییری در حجم محلول ایجاد نکند، مقدار pH این محلول‌ها تقریباً اندازه چند واحد با هم فرق می‌کند؟ ( $\text{Br} = 80, \text{N} = 14, \text{C} = 12, \text{H} = 1; \text{g.mol}^{-1}$ )

- ۴/۹ (۱)      ۴/۴ (۲)      ۳/۹ (۳)      ۳/۴ (۴)





۲۰۴- محلولی با غلظت ۰/۰۵ مولار از اسید قوی HA و غلظت ۰/۱ مولار از اسید ضعیف HB در اختیار داریم. اگر pH این محلول اسیدی برابر با ۱/۱۵ باشد، ثابت یونش اسید HB در این شرایط تقریباً کدام است؟

- (۱)  $2 \times 10^{-3}$  (۲)  $1/75 \times 10^{-2}$  (۳)  $5 \times 10^{-3}$  (۴)  $1/4 \times 10^{-2}$

۲۰۵- محلول‌های مجزایی با درصد جرمی و چگالی برابر از نیتریک اسید و هیدروبرمیک اسید در اختیار داریم. خاصیت اسیدی محلول ..... بیشتر بوده و pH این محلول تقریباً به اندازه ..... واحد کم‌تر از محلول دیگر است. ( $\text{Br} = 80, \text{O} = 16, \text{N} = 14, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}$ )

- (۱) هیدروبرمیک اسید - ۰/۱۵ (۲) نیتریک اسید - ۰/۱۵ (۳) هیدروبرمیک اسید - ۰/۳ (۴) نیتریک اسید - ۰/۳

۲۰۶- از سوختن نیتروژن موجود در سوخت‌ها، گاز  $\text{NO}_x$  حاصل شده و این گاز براساس معادله موازنه‌نشده  $\text{NO}_x + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HNO}_3$  موجب تولید نیتریک اسید می‌شود. اگر غلظت نیتروژن در یک نمونه گازوئیل برابر ۴۲۰۰ ppm باشد، از سوختن نیتروژن موجود در ۱۰ kg گازوئیل، چند تن باران اسیدی با pH = ۳ و چگالی  $1 \text{ g.mL}^{-1}$  تولید می‌شود؟ ( $\text{N} = 14 \text{ g.mol}^{-1}$ )

- (۱) ۳۰ (۲) ۶۰ (۳) ۳ (۴) ۶

۲۰۷- اگر pH محلولی از اسید HA با درجه یونش ۰/۲، برابر با pH محلولی از اسید HB با درجه یونش ۰/۲۵ باشد، مقدار  $K_a$  برای اسید HA چند برابر مقدار  $K_a$  برای اسید HB است؟

- (۱) ۱/۲ (۲) ۰/۸ (۳) ۰/۷۵ (۴) ۰/۶

### محاسبه pH آب خالص

۲۰۸- چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟

(آ) مقدار pH نوشابه گازدار، همانند pH خون بدن انسان، کم‌تر از ۷ است.

(ب) از کمیت pH، می‌توان برای پرهیز از بیان غلظت کم و بسیار کم یون هیدروژن استفاده کرد.

(پ) آب خالص، محتوی مقدار اندکی از یون‌های  $\text{OH}^-$  و  $\text{H}_3\text{O}^+$  بوده و رسانایی الکتریکی ناچیزی دارد.

(ت) در یک محلول اسیدی با  $\text{pH} = 0$ ، غلظت مولی یون هیدروکسید برابر صفر مول بر لیتر است.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۰۹- چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟

(آ) به هر اندازه که غلظت یون هیدرونیوم در یک محلول بیشتر شود، به همان اندازه از غلظت یون هیدروکسید کاسته می‌شود.

(ب) در دمای  $25^\circ\text{C}$ ، غلظت یون هیدرونیوم در یک نمونه از شیر ترش شده، بیشتر از  $10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$  است.

(پ) با افزودن آب خالص به یک محلول اسیدی، قدرت اسیدی و مقدار  $K_a$  برای محلول موردنظر کاهش پیدا می‌کند.

(ت) در یک نمونه آب باران، غلظت مولی یون هیدرونیوم، بیشتر از غلظت مولی یون هیدروکسید است.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۱۰- کدام یک از مطالب زیر نادرست است؟

(۱) در محلولی از یک اسید قوی با  $\text{pH} = 4$ ، غلظت مولی یون هیدرونیوم،  $10^6$  برابر غلظت مولی یون هیدروکسید است.

(۲) غلظت مولی یون هیدروکسید در نمونه‌ای از اسید معده انسان، کم‌تر از غلظت مولی این یون در آب گازدار است.

(۳) پتاسیم اکسید و سدیم اکسید، در دسته اکسیدهای بازی قرار داشته و محلول آن‌ها در آب، یک الکترولیت قوی است.

(۴) اگر درجه یونش اسید HA برابر ۰/۰۸ باشد، pH محلول ۰/۵ مولار این اسید در دمای  $25^\circ\text{C}$  برابر با ۲/۴ می‌شود.

۲۱۱- نمودار مقابل، غلظت مولی یکی از یون‌های موجود در شربت معده و اسید معده را در دمای

$25^\circ\text{C}$  نشان می‌دهد. چه تعداد از مطالب زیر، در رابطه با این محلول‌ها درست است؟

(آ) pH اسید معده به اندازه ۸ واحد کم‌تر از pH شربت معده است.


(ب) غلظت یون هیدروکسید در اسید معده،  $10^8$  برابر غلظت این یون در شربت معده است.

(پ) شربت معده، همانند محتویات روده کوچک انسان، خاصیت بازی دارد.

(ت) در صورت مجاورت کاغذ pH با شربت معده، این کاغذ به رنگ آبی درمی‌آید.

(ث) در اسید معده، همانند عصاره گوجه‌فرنگی، غلظت یون هیدرونیوم بیشتر از یون هیدروکسید است.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴







۲۱۲- غلظت یون هیدرونیوم در یک نمونه محلول هیدروفلوئوریک اسید با  $\text{pH} = 6/5$ ، تقریباً به اندازهٔ ..... مول بر لیتر ..... از غلظت یون هیدروکسید در این محلول است.

- (۱)  $3/3 \times 10^{-7}$  - کمتر (۲)  $2/7 \times 10^{-7}$  - کمتر (۳)  $3/3 \times 10^{-7}$  - بیشتر (۴)  $2/7 \times 10^{-7}$  - بیشتر

۲۱۳- برای تهیهٔ ۲ لیتر محلول بنزوئیک اسید با  $K_a = 1/6 \times 10^{-5}$  که در آن غلظت یون هیدرونیوم  $1/6 \times 10^7$  برابر غلظت یون هیدروکسید باشد، به چند گرم از این ترکیب شیمیایی نیاز داریم؟ ( $\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}$ )

- (۱)  $2/44$  (۲)  $1/22$  (۳)  $3/66$  (۴)  $4/88$

۲۱۴- در محلولی از هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 3$ ، غلظت مولی یون هیدروژن ..... برابر غلظت مولی یون هیدروکسید است و برای آن که  $\text{pH}$  هر لیتر از این محلول به نصف مقدار اولیهٔ آن کاهش پیدا کند، باید ..... میلی‌گرم  $\text{HCl(g)}$  در این محلول حل شود. ( $\text{Cl} = 35/5, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}$ )

- (۱)  $1058/5 - 10^4$  (۲)  $693/5 - 10^7$  (۳)  $693/5 - 10^8$  (۴)  $1058/5 - 10^7$

### محاسبهٔ pH محلول بازهای قوی وضعیف

۲۱۵- غلظت مولی یون کلرید در محلولی از هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 2/7$ ، چند برابر غلظت مولی یون سدیم در محلولی از سدیم هیدروکسید با  $\text{pH} = 9/7$  است؟

- (۱) ۴۰ (۲) ۲۵ (۳) ۲۰ (۴) ۵

۲۱۶- برای تهیهٔ ۵۰۰ میلی‌لیتر محلول بازی با  $\text{pH} = 12/6$ ، باید چند گرم باریم اکسید جامد را در مقدار کافی آب حل کنیم؟ ( $\text{Ba} = 137, \text{O} = 16: \text{g.mol}^{-1}$ )

- (۱)  $3/06$  (۲)  $2/92$  (۳)  $4/59$  (۴)  $1/53$


۲۱۷- کدام یک از مطالب زیر نادرست است؟

- (۱) محلول بازهای معروفی مثل سود سوزآور و پتاس سوزآور از جمله بازهای قوی هستند و موادی خورنده به شمار می‌روند.
- (۲) مولکول‌های آمونیاک با مولکول‌های آب پیوند هیدروژنی تشکیل داده و در آب به طور عمده به شکل مولکولی حل می‌شوند.
- (۳) در شرایط یکسان از نظر دما و غلظت، هر چه  $K_b$  یک باز بزرگ‌تر باشد، محلول آن باز  $\text{pH}$  کوچک‌تری خواهد داشت.
- (۴) یک تعادل شیمیایی بین مولکول‌های آمونیاک و یون‌های  $\text{OH}^-$  و  $\text{NH}_4^+$  در محلول آبی آمونیاک برقرار می‌شود.

۲۱۸-  $89/6 \text{ mL}$  گاز آمونیاک را در شرایط استاندارد، در ۲ لیتر آب حل می‌کنیم. پس از یونش مولکول‌های آمونیاک،

محلول موردنظر به صورت مقابل درمی‌آید.  $\text{pH}$  این محلول کدام است؟

- (۱)  $10/3$  (۲)  $9/7$  (۳)  $10/7$  (۴)  $11/3$



۲۱۹-  $\text{pH}$  محلولی از سدیم هیدروکسید که در هر گرم از آن، ۱۶ میلی‌گرم از این ماده وجود دارد، کدام است؟

( $\text{Na} = 23, \text{O} = 16, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}, d_{\text{محلول}} = 1/25 \text{ g.mL}^{-1}$ )

- (۱)  $13/3$  (۲)  $13/5$  (۳)  $13$  (۴)  $13/7$

۲۲۰- اگر انحلال‌پذیری منیزیم هیدروکسید در دمای  $25^\circ \text{C}$ ، برابر با  $6/96 \times 10^{-4} \text{ g}$  در  $100 \text{ g}$  آب باشد،  $\text{pH}$  محلول سیرشدهٔ این ترکیب در دمای  $25^\circ \text{C}$  تقریباً چه قدر است؟

- (۱)  $9/6$  (۲)  $10/4$  (۳)  $10/1$  (۴)  $9/9$

۲۲۱- کدام یک از مطالب زیر درست است؟


- (۱) با افزودن مقداری آب خالص به محلولی از یک اسید قوی، غلظت یون هیدروکسید در محلول افزایش می‌یابد.
- (۲) اگر درصد یونش اسید ضعیف  $\text{HA}$  در محلول یک مولار آن برابر ۲٪ باشد، مقدار  $K_a$  این اسید برابر  $2 \times 10^{-2}$  می‌شود.
- (۳) هر لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید که  $\text{pH}$  آن برابر ۱۲ باشد، تقریباً شامل  $10^{-2}$  مول یون می‌شود.
- (۴) در یک نمونه از محلول نیترو اسید، غلظت مولی یون هیدرونیوم بیشتر از غلظت مولی ذرات اسید یونیده‌نشده است.

۲۲۲- معادلهٔ انحلال‌پذیری باز قوی  $\text{BOH}$  به صورت  $S = 2 + 0/25\theta$  است. دمای  $238$  گرم از محلول سیرشدهٔ این ترکیب را از  $68^\circ \text{C}$  تا  $36^\circ \text{C}$  کاهش می‌دهیم. با استفاده از باز ته‌نشین‌شده در این فرایند، چند لیتر محلول بازی با  $\text{pH} = 13$  می‌توان تهیه کرد؟ ( $\text{BOH} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$ )

- (۱) ۲ (۲)  $2/5$  (۳) ۴ (۴) ۵



۲۲۲- از میان نمودارهای زیر، شکل ..... وابستگی pH یک محلول نسبت به غلظت یون هیدرونیوم و شکل ..... نیز وابستگی pH محلول باز BOH به درصد تفکیک این باز را به درستی نشان می‌دهد.



III, II (۴)

III, I (۳)

IV, II (۲)

IV, I (۱)

۲۲۴- انحلال پذیری سدیم هیدروکسید در دمای ۲۵ °C، تقریباً برابر با ۱۲۰ g در ۱۰۰ g آب است. اگر چگالی محلول سیرشده این ترکیب در دمای موردنظر برابر با ۱/۱ g.mL<sup>-۱</sup> باشد، pH محلول سیرشده آن در دمای موردنظر کدام است؟ (Na = ۲۳, O = ۱۶, H = ۱: g.mol<sup>-۱</sup>)

۱۵/۲ (۴)

۱۴/۹ (۳)

۱۳/۱ (۲)

۱۲/۳ (۱)

۲۲۵- HA، یک اسید قوی با جرم مولی m g.mol<sup>-۱</sup> و BOH نیز یک باز قوی با جرم مولی ۱۰m g.mol<sup>-۱</sup> است. جرم‌های برابری از این اسید و باز را به صورت مجزا در مقداری آب حل کرده و حجم هر محلول را به ۲ لیتر می‌رسانیم. اگر تفاوت pH این محلول‌ها برابر با ۹/۶ واحد باشد، pH محلول اسیدی برابر با کدام یک از گزینه‌های زیر می‌شود و در هر لیتر از محلول باز BOH چند مول از این باز حل شده است؟

۸ × ۱۰<sup>-۴</sup> - ۱/۳ (۴)

۸ × ۱۰<sup>-۳</sup> - ۲/۳ (۳)

۲ × ۱۰<sup>-۲</sup> - ۲/۷ (۲)

۲ × ۱۰<sup>-۳</sup> - ۱/۷ (۱)

۲۲۶- مجموع غلظت مولی یون‌ها در یک نمونه از محلول باریم هیدروکسید با pH = ۱۳/۳، با مجموع غلظت مولی یون‌ها در یک نمونه محلول هیدروکلریک اسید برابر است. در این شرایط، pH محلول هیدروکلریک اسید کدام است؟

۱/۲ (۴)

۰/۸ (۳)

۱/۴ (۲)

۰/۶ (۱)

۲۲۷- ۱۰۰ g آهن (III) اکسید با خلوص ۸۰ درصد را با مقدار کافی فلز سدیم وارد واکنش کرده و سدیم اکسید حاصل از این فرایند را در ۶۰ لیتر آب خالص حل می‌کنیم. در صورتی که انحلال این ترکیب، تغییری در حجم محلول ایجاد نکند، pH محلول حاصل از این فرایند کدام است؟ (Fe = ۵۶, O = ۱۶: g.mol<sup>-۱</sup>)

۱۲/۷ (۴)

۱۲/۳ (۳)

۱۱/۷ (۲)

۱۱/۳ (۱)

۲۲۸- در محلول منیزیم هیدروکسید در آب، غلظت یون‌ها از رابطه  $[Mg^{2+}][OH^-]^2 = 1/5 \times 10^{-11} \text{ mol}^3 \cdot L^{-3}$  پیروی می‌کند. حداکثر غلظت منیزیم سولفات قابل حل در محلول سدیم هیدروکسید با pH = ۹، برابر چند مول بر لیتر است؟ (سراسری ریاضی فارج از کشور ۹۴)

۰/۱۵ (۴)

۰/۳۰ (۳)

۳ × ۱۰<sup>-۶</sup> (۲)

۱/۵ × ۱۰<sup>-۶</sup> (۱)

۲۲۹- ۴ گرم سدیم هیدروکسید و ۴ گرم گاز هیدروژن فلوئورید را به طور مجزا در یک لیتر آب خالص حل می‌کنیم. اگر pH محلول‌های حاصل از این فرایند به اندازه ۱۰/۷ واحد با هم تفاوت داشته باشد، مقدار K<sub>a</sub> برای هیدروفلوئوریک اسید در شرایط موردنظر کدام است؟ (Na = ۲۳, F = ۱۹, O = ۱۶, H = ۱: g.mol<sup>-۱</sup>)

۴ × ۱۰<sup>-۵</sup> (۴)

۱/۲۵ × ۱۰<sup>-۴</sup> (۳)

۵ × ۱۰<sup>-۴</sup> (۲)

۸ × ۱۰<sup>-۵</sup> (۱)

### تغییر غلظت محلول‌های اسیدی و بازی

۲۳۰- pH مناسب برای زنده ماندن ماهی‌های درون یک آکواریوم (آبی‌دان)، بین ۶ تا ۸/۵ است. اگر حجم آب موجود در این آکواریوم برابر ۲۰ L باشد، افزودن کدام یک از نمونه‌های زیر به آب این آکواریوم، سبب مرگ ماهی‌ها می‌شود؟ (Na = ۲۳, O = ۱۶, N = ۱۴, H = ۱: g.mol<sup>-۱</sup>)

۲ گرم سدیم هیدروکسید جامد با خلوص ۴۰ درصد

۴ میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید با pH = ۲/۷

۲۰ میلی‌لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید با pH = ۱۱

۰/۶۳ گرم نیتریک اسید خالص

۲۳۱- برای رساندن pH یک نمونه ۵۴۰ گرمی از آب خالص به ۲، باید چند میلی‌لیتر از محلول نیتریک اسید با pH = ۱ را به این نمونه آب اضافه کنیم؟

۴۰ (۴)

۶۰ (۳)

۷۵ (۲)

۱۰ (۱)

۲۳۲- با افزودن ۵۰۰ mL آب خالص به ۱۰۰ mL محلول هیدروکلریک اسید با pH = ۲، مقدار pH این محلول به اندازه چند واحد افزایش پیدا می‌کند؟

۱/۲ (۴)

۰/۸ (۳)

۰/۷ (۲)

۰/۵ (۱)



۲۳۳- برای آن که pH دو لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید را از ۹ به ۱۰ برسانیم، به چند میلی‌گرم پتاسیم هیدروکسید نیاز داریم؟  
( $K = 39, O = 16, H = 1; g.mol^{-1}$ )

- ۵/۰۴ (۱)      ۳/۳۶ (۲)      ۱۰/۰۸ (۳)      ۶/۷۲ (۴)

۲۳۴- به ۸۰ mL محلول هیدروکلریک اسید با  $pH = 2$ ، ۷۲۰ میلی‌لیتر آب خالص اضافه می‌کنیم. طی این فرایند، pH محلول به اندازه ..... واحد تغییر می‌کند و غلظت یون هیدروکسید در این محلول نیز ..... برابر می‌شود.

- ۱۰-۱ (۱)      ۰/۱-۲ (۲)      ۰/۱-۱ (۳)      ۱۰-۲ (۴)

۲۳۵- به ۱۰۰ mL محلول سدیم هیدروکسید با  $pH = 12/7$ ، به قدری آب خالص اضافه می‌کنیم تا pH محلول به ۱۱ برسد. طی این فرایند، شمار یون‌های هیدرونیوم موجود در محلول موردنظر چند برابر می‌شود؟

- ۰/۰۰۵ (۱)      ۰/۰۲ (۲)      ۵۰ (۳)      ۲۵۰۰ (۴)

۲۳۶- نمودار مقابل، غلظت یون‌های هیدروژن و هیدروکسید موجود در ۲۰۰ mL محلول ۰/۱ مولار اسید HA را نشان می‌دهد. چند مورد از مطالب زیر در رابطه با این محلول درست هستند؟

- (آ) با افزودن مقداری آب خالص به این محلول، درجه یونش اسید HA افزایش می‌یابد.  
(ب) اگر غلظت یون  $OH^-$  را در این محلول ۱۰۰ برابر کنیم، pH آن ۲ درجه افزایش پیدا می‌کند.  
(پ) این ترکیب اسیدی، همانند نیتریک اسید، در دسته اسیدهای قوی قرار می‌گیرد.  
(ت) در صورت اضافه کردن ۸۰۰ mL آب خالص به این محلول، pH آن دو برابر می‌شود.

- ۱ (۱)      ۲ (۲)      ۳ (۳)      ۴ (۴)

۲۳۷- یک نمونه محلول ۲۰ درصد جرمی سدیم هیدروکسید را به دو قسمت مجزا تقسیم کرده و در بشرهای A و B می‌ریزیم. در مرحله بعد، جرم سدیم هیدروکسید موجود در ظرف A و جرم آب موجود در ظرف B را دو برابر می‌کنیم. اگر چگالی محلول‌های حاصل از این فرایند با هم برابر باشد، pH محلول A به اندازه ..... واحد ..... از pH محلول B است.

- ۰/۵ - بیشتر (۱)      ۰/۵ - کم‌تر (۲)      ۰/۷ - بیشتر (۳)      ۰/۷ - کم‌تر (۴)

۲۳۸- در محلول سیرشده‌ای از نقره هیدروکسید، غلظت یون‌ها از رابطه  $[Ag^+][OH^-] = 10^{-8}$  پیروی می‌کند. در این شرایط، مقدار pH یک نمونه محلول سیرشده نقره هیدروکسید در آب خالص برابر ..... بوده و حداکثر ..... میلی‌گرم نقره هیدروکسید را می‌توان در ده لیتر محلول سدیم هیدروکسید با  $pH = 12$  حل کرد. ( $Ag = 108, O = 16, H = 1; g.mol^{-1}$ )

- ۱/۲۵ - ۱۰ (۱)      ۰/۲۵ - ۱۲ (۲)      ۰/۲۵ - ۱۰ (۳)      ۱/۲۵ - ۱۲ (۴)

۲۳۹- ۸۰ میلی‌لیتر محلول سود سوزآور با  $pH = 13/3$  را با ۱۲۰ میلی‌لیتر محلول پتاس سوزآور با  $pH = 13/85$  مخلوط می‌کنیم. pH محلول حاصل از این فرایند کدام است؟


- ۱۳/۷ (۱)      ۱۳/۵ (۲)      ۱۳/۴ (۳)      ۱۳/۶ (۴)

۲۴۰- ۱۰ mL محلول اسید ضعیف HA با  $K_a = 10^{-5}$  و  $pH = 3$  در اختیار داریم. پس از افزودن ۹۹۰ میلی‌لیتر آب خالص به این محلول، pH آن چه قدر می‌شود؟

- ۵ (۱)      ۳/۵ (۲)      ۴ (۳)      ۴/۵ (۴)

۲۴۱- برای تهیه ۵ kg محلول نیتریک اسید با غلظت ۱۲۶۰ ppm، به چند میلی‌لیتر محلول نیتریک اسید با  $pH = 0/7$  نیاز داریم؟  
( $O = 16, N = 14, H = 1; g.mol^{-1}$ )

- ۲۰۰ (۱)      ۵۰۰ (۲)      ۷۵۰ (۳)      ۳۰۰ (۴)









## واکنش اسیدها با فلزها

اغلب فلزها، با محلول‌های اسیدی واکنش داده و گاز هیدروژن آزاد می‌کنند. طی این فرایند، اتم‌های فلزی الکترون از دست داده و در قالب کاتیون‌های فلزی وارد محلول می‌شوند. به عنوان مثال، فلز سدیم براساس معادله  $2\text{Na}(s) + 2\text{HCl}(aq) \rightarrow 2\text{NaCl}(aq) + \text{H}_2(g)$  با محلول هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهد.


**نکته** ۲۰۰ mL محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 3$ ، با چند میلی‌گرم فلز روی به طور کامل واکنش می‌دهد؟ ( $\text{Zn} = 65 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ )

۱۳۰ (۴)


۶۵ (۳)

۱۳ (۲)

۶/۵ (۱)



**پاسخ** گزینه «۱» گام اول: واکنش انجام‌شده را مشخص می‌کنیم:



گام دوم: مقدار مول‌های HCl موجود در محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$? \text{ mol HCl} = 200 \text{ mL محلول} \times \frac{1 \text{ L محلول}}{1000 \text{ mL محلول}} \times \frac{10^{-3} \text{ mol HCl}}{1 \text{ L محلول}} = 2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

گام سوم: براساس معادله واکنش انجام‌شده، جرم فلز روی را به دست می‌آوریم:


$$? \text{ mg Zn} = 2 \times 10^{-4} \text{ mol HCl} \times \frac{1 \text{ mol Zn}}{2 \text{ mol HCl}} \times \frac{65 \text{ g Zn}}{1 \text{ mol Zn}} \times \frac{1000 \text{ mg Zn}}{1 \text{ g Zn}} = 6/5 \text{ mg}$$

## پاک‌کننده‌های خورنده

گروهی از پاک‌کننده‌ها هستند که بر مبنای واکنش میان اسیدها و بازها عمل می‌کنند. در هنگام استفاده از این مواد، شوینده موردنظر با آلودگی‌ها وارد واکنش شده و آن‌ها را به مواد محلول در آب تبدیل می‌کند. شوینده‌های خورنده را بر مبنای کاربرد آن‌ها، می‌توان به دو دسته اسیدی و بازی تقسیم‌بندی کرد:

## شوینده‌های خورنده بازی


از این شوینده‌ها برای پاک‌کردن رسوب‌ها و آلودگی‌هایی با خاصیت اسیدی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر مسیر لوله‌ای با مخلوطی از اسیدهای چرب جامد ( $\text{RCOOH}(s)$ ) مسدود شده باشد، برای بازکردن راه آن می‌توان از محلول غلیظ سدیم هیدروکسید به عنوان یک پاک‌کننده خورنده استفاده کرد. محلول سدیم هیدروکسید براساس معادله زیر با این آلودگی‌ها واکنش می‌دهد:



**نکته** با دقت در معادله این واکنش، متوجه می‌شویم که یکی از فرآورده‌های آن، نمک سدیم اسیدهای چرب یا همون صابون است. صابون حاصل از این واکنش، در آب حل شده و می‌تواند چربی‌های اضافی را بزاید.

## شوینده‌های خورنده اسیدی

از این پاک‌کننده‌ها برای زدودن آلودگی‌هایی با خاصیت بازی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر مسیر لوله‌ای با رسوب کلسیم کربنات بسته شده باشد، برای بازکردن راه آن می‌توان از محلول هیدروکلریک اسید استفاده کرد. محلول هیدروکلریک اسید براساس معادله زیر با رسوب ایجادشده واکنش می‌دهد:




صابون‌ها و پاک‌کننده‌های غیرصابونی، بر مبنای برهم‌کنش‌های بین مولکولی با آلودگی‌ها، سبب پاک‌کردن آن‌ها می‌شوند اما پاک‌کننده‌های خورنده در کنار برهم‌کنش‌های بین مولکولی، بر مبنای واکنش‌های شیمیایی که با آلودگی‌ها می‌دهند نیز سبب پاک‌کردن آن‌ها از محیط می‌شوند.

## داروهای ضد اسید معده‌ای

با ورود غذا به معده انسان، غدد موجود در دیواره معده برای از بین بردن میکروب‌های موجود در غذاها و فعال کردن آنزیم‌های گوارشی، شروع به ترشح هیدروکلریک اسید می‌کنند. در بدن انسان بالغ، روزانه بین ۲ تا ۳ لیتر شیره معده تولید می‌شود که غلظت یون هیدرونیوم در آن حدوداً برابر با  $0.3 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  است. با به حساب سرانگشتی، متوجه می‌شویم که pH اسید ترشح‌شده در معده تقریباً برابر ۱/۵ است و به همین خاطر، فضای درون معده را می‌توان یک محیط اسیدی به حساب آورد؛ به طوری که این اسید می‌تواند فلز روی را در خود حل کند.

دیواره داخلی معده، به طور طبیعی مقدار اندکی از یون‌های هیدرونیوم ترشح‌شده را مجدداً جذب می‌کند. این فرایند، سبب نابودی برخی از سلول‌های سازنده دیواره معده می‌شود. در این شرایط، اگر مقدار اسید موجود در معده به هر دلیلی بیش از اندازه باشد، مقدار یون‌های هیدرونیوم جذب‌شده توسط دیواره معده بیشتر شده و مقدار بیشتری از سلول‌های دیواره معده آسیب می‌بینند. آسیب به سلول‌های دیواره معده، سبب درد، التهاب و گاهی خونریزی معده می‌شود.

با توجه به توضیحات داده شده، مصرف غذاها و داروهای اسیدی سبب تشدید بیماری‌های معده خواهد شد. به همین دلیل کسانی که به بیماری‌های معده‌ای مبتلا هستند باید میزان مصرف غذاهای اسیدی را کاهش داده و به جای داروهای اسیدی، از داروهای دیگری به عنوان جایگزین استفاده کنند. پزشکان مقرر نیز برای مقابله با این مقدار اضافی از اسید موجود در معده، از داروهایی به نام ضداسید یا همون آنتی‌اسید استفاده می‌کنند. این داروها خاصیت بازی داشته و با ورود به معده، سبب خنثی کردن اسید معده و افزایش pH محتویات معده می‌شوند. مواد مؤثر موجود در ضداسیدهای مختلف، شامل منیزیم هیدروکسید ( $Mg(OH)_2$ )، آلومینیم هیدروکسید ( $Al(OH)_3$ ) و سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین یا  $NaHCO_3$ ) می‌شود. این مواد براساس معادله‌های زیر با اسید معده واکنش می‌دهند:



### چندنگه

◀ pH شیره معده به قدری پایین است که سبب از بین رفتن حدود نیم میلیون یاخته از بافت دیواره معده در هر دقیقه می‌شود. برگشت شیره معده به مری، ریفلاکس معده نام دارد که سبب ایجاد بوی ترش در گلو و دهان می‌شود. ساده‌ترین روش درمان ریفلاکس معده، افزایش تعداد وعده‌های غذایی در روز و کاهش حجم هر وعده غذایی است.


◀ شیر منیزی، یکی از رایج‌ترین ضداسیدهای مورد استفاده به شمار می‌رود که ماده مؤثر موجود در آن، منیزیم هیدروکسید است.

◀ شربت معده، یک داروی ضداسید است که محتوی  $Mg(OH)_2$  و  $Al(OH)_3$  می‌باشد. از آن‌جا که ترکیبات موجود در این دارو انحلال‌پذیری بسیار کمی در آب دارند، شربت معده را می‌توان یک مخلوط ناهمگن و متعلق به دسته سوسپانسیون‌ها به حساب آورد.

◀ در زمان استراحت، pH محتویات معده حدوداً به اندازه ۲ واحد افزایش پیدا کرده و به ۳/۶ می‌رسد. غلظت یون هیدرونیوم موجود در شیره معده در این شرایط برابر  $10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$  است.

◀ داروهای ضداسید مختلف، می‌توانند حاوی یک یا چند مورد از مواد مؤثر نام برده شده باشند.

◀ واکنش میان محلول هیدروکلریک اسید با محلول سدیم هیدروژن کربنات از دیدگاه ذره‌ای به صورت مقابل است:



یون‌های هیدروژن کربنات ( $HCO_3^-$ ) شرکت‌کننده در این واکنش، ابتدا یک یون هیدروژن را جذب کرده و به کربنیک اسید ( $H_2CO_3$ ) تبدیل می‌شوند. از آن‌جا که ذرات کربنیک اسید ناپایدار هستند، به سرعت به گاز کربن دی‌اکسید و مولکول‌های آب تجزیه می‌شوند.

◀ از آن‌جا که اضافه کردن محلول سدیم هیدروژن کربنات به یک محلول دیگر، سبب کاهش غلظت یون هیدروژن در آن محلول می‌شود، پس می‌توان گفت که سدیم هیدروژن کربنات خاصیت بازی داشته و محلول آن یک محلول بازی با pH بزرگ‌تر از ۷ است.

◀ برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی چربی‌ها، به شوینده‌ها جوش شیرین یا همون سریم هیدروژن کربنات می‌افزایند. اضافه کردن این ماده به شوینده‌ها، سبب افزایش خاصیت بازی آن‌ها می‌شود و علاوه بر آن، در صورت استفاده از آب‌های سخت برای شست‌وشوی لباس‌ها، یون‌های  $HCO_3^-$  موجود در شوینده موردنظر با یون‌های منیزیم و کلسیم موجود در آب سخت تشکیل رسوب داده و این یون‌ها را از محلول خارج می‌کند.

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

### واکنش خنثی شدن

۲۴۲- چند میلی‌لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید با  $pH = 13$  برای واکنش کامل با ۲۵ میلی‌لیتر محلول  $4 \text{ mol.L}^{-1}$  / سولفوریک اسید نیاز است؟

(۱) ۵۰ (۲) ۱۰۰ (۳) ۲۰۰ (۴) ۲۵۰ (سراسری ریاضی ۹۲)

۲۴۳- ۵۰ mL از یک نمونه محلول هیدروکلریک اسید با  $pH = 2/3$ ، با ۱۲۵۰ mL محلول سدیم هیدروکسید به طور کامل واکنش می‌دهد. در این شرایط، pH محلول سدیم هیدروکسید چه قدر است؟

(۱) ۱۱/۷ (۲) ۱۱/۳ (۳) ۱۰/۷ (۴) ۱۰/۳

۲۴۴- برای خنثی کردن کامل ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید با  $pH = 13/7$ ، به چند گرم هیدروژن دیدید با خلوص ۶۴٪ نیاز است؟

( $I = 127, H = 1: \text{g.mol}^{-1}$ )

(۱) ۲۰ (۲) ۱۰ (۳) ۱۶ (۴) ۸



۲۴۵- به ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 3$ ، مقداری محلول سدیم هیدروکسید با  $\text{pH} = 12$  اضافه می‌کنیم تا به طور کامل خنثی شود. طی این فرایند، شمار یون‌های هیدرونیوم موجود در محلول موردنظر چند برابر می‌شود؟

- (۱)  $1/1 \times 10^{-4}$  (۲)  $10^{-4}$  (۳)  $1/1 \times 10^{-3}$  (۴)  $10^{-3}$

۲۴۶- غلظت یون هیدروکسید در محلولی از کلسیم هیدروکسید با  $\text{pH} = 10$  و چگالی  $1 \text{ g.mL}^{-1}$ ، برابر ..... قسمت در میلیون بوده و هر لیتر از این محلول، با ..... میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 2$  به طور کامل واکنش می‌دهد. ( $\text{O} = 16, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}$ )

- (۱)  $10 - 1/7$  (۲)  $100 - 17$  (۳)  $100 - 1/7$  (۴)  $10 - 17$

۲۴۷- یک ظرف محتوی ۵۰۰ میلی‌لیتر محلول سدیم هیدروکسید با  $\text{pH} = 12$  در اختیار داریم. با حل کردن چند میلی‌لیتر گاز هیدروژن کلرید در شرایط استاندارد در این محلول،  $\text{pH}$  آن به اندازه ۵ واحد کاهش پیدا می‌کند؟

- (۱) ۲۲۴ (۲) ۱۱۲ (۳) ۲۲/۴ (۴) ۱۱/۲

۲۴۸- اگر در ۲۰۰ mL از محلول سدیم هیدروکسید، ۸۰ میلی‌گرم از آن به صورت حل‌شده وجود داشته باشد،  $\text{pH}$  این محلول برابر با .....،  $[\text{OH}^-]$  در آن، ..... برابر  $[\text{H}^+]$  است و ۱۰ mL از آن می‌تواند ..... mL محلول  $0.002 \text{ mol.L}^{-1}$  هیدروکلریک اسید را خنثی کند. (سراسری ریاضی فارغ از کشور ۹۰) ( $\text{Na} = 23, \text{O} = 16, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}$ )

- (۱)  $12/7 - 10^8 - 50$  (۲)  $12/7 - 10^1 - 40$  (۳)  $12 - 10^1 - 50$  (۴)  $12 - 10^8 - 40$

۲۴۹- ۱۰۰ mL محلول ۰/۵ مولار اسید HA ( $K_a = 5 \times 10^{-3}$ ) تهیه شده است.  $\text{pH}$  این محلول به تقریب کدام است و برای خنثی کردن کامل آن، چند گرم سدیم هیدروکسید لازم است؟ ( $\text{NaOH} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$ ) (سراسری تهرنی فارغ از کشور ۹۲)

- (۱)  $1 - 2/6$  (۲)  $2 - 2/6$  (۳)  $1 - 1/3$  (۴)  $2 - 1/3$

۲۵۰- ظرف زیر، محتوی ۵۰۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۵ مولار هیدروکلریک اسید است. در صورت اضافه کردن ۰/۱ مول سدیم هیدروکسید جامد به این محلول، ..... (۱) میزان روشنایی لامپ قرارگرفته در مدار الکتریکی، تغییر محسوسی نمی‌کند. (۲)  $\text{pH}$  آن شروع به افزایش یافتن کرده و به بالاتر از ۷ می‌رسد. (۳) مقداری گاز هیدروژن تولیدشده و از محلول موردنظر خارج می‌شود. (۴) غلظت یون هیدروکسید موجود در آن ۱/۲۵ برابر می‌شود.

۲۵۱- در محلول یک باز قوی، غلظت مولار یون هیدروکسید  $4 \times 10^8$  برابر غلظت یون هیدروژن است. برای خنثی کردن دو لیتر از این محلول چند میلی‌لیتر گاز هیدروژن کلرید در شرایط استاندارد را باید در آن حل کنیم؟

- (۱)  $22/4$  (۲)  $89/6$  (۳)  $2/24$  (۴)  $8/96$

۲۵۲- چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟

(آ)  $\text{pH}$  محلولی که غلظت یون  $\text{OH}^-$  در آن برابر  $2 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$  است، تقریباً برابر ۱۰/۷ می‌باشد.

(ب) اگر حجم محلول یک اسید قوی را با افزودن آب خالص به آن، ۲ برابر کنیم،  $\text{pH}$  محلول ۰/۳ واحد کاهش می‌یابد.

(پ) با تغییر حجم محلول یک اسید قوی در دمای ثابت، حاصل ضرب غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید تغییری نمی‌کند.

(ت) عصاره گوجه‌فرنگی، خاصیت بازی داشته و با وارد شدن آن به معده انسان،  $\text{pH}$  محتویات معده افزایش می‌یابد.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۵۳- ۲۰۰ mL محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 2$  در اختیار داریم. با افزودن ..... میلی‌گرم سدیم هیدروکسید به این محلول، محلولی حاصل می‌شود که خاصیت ..... دارد. ( $\text{Na} = 23, \text{O} = 16, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}$ )


- (۱) اسیدی - ۱۰۰ (۲) بازی - ۱۰۰ (۳) اسیدی - ۸۰ (۴) بازی - ۸۰

۲۵۴- ۳۰۰ mL محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 2/3$  را با ۵۰۰ mL محلول نیتریک اسید با  $\text{pH} = 3$  مخلوط می‌کنیم.  $\text{pH}$  محلول حاصل از این فرایند کدام است؟

- (۱)  $2/7$  (۲)  $2/6$  (۳)  $2/4$  (۴)  $2/5$

۲۵۵- محلول ۰/۱ مولار اسید ضعیف HA ( $K_a = 10^{-7}$ ) با اضافه کردن کلسیم هیدروکسید جامد در حال خنثی شدن است.  $\text{pH}$  این محلول، از آغاز واکنش تا خنثی شدن ۵۰ درصد از مقدار اسید، به تقریب چند واحد تغییر می‌کند؟ (نمک  $\text{CaA}$  نامحلول در آب است.) (سراسری ریاضی فارغ از کشور ۹۲)

- (۱)  $0/3$  (۲)  $0/2$  (۳)  $0/4$  (۴)  $0/15$



۲۵۶- نمودار مقابل، غلظت مولی یون هیدرونیوم موجود در دو محلول را در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  نشان می‌دهد. چه تعداد از مطالب زیر، در رابطه با این محلول‌ها نادرست است؟

- (آ) هر میلی‌لیتر از محلول B، توسط  $1000$  میلی‌لیتر از محلول A خنثی می‌شود.  
 (ب) در محلول A، غلظت یون هیدرونیوم  $10^{12}$  برابر غلظت یون هیدروکسید است.  
 (پ) محلول B همانند محلول آمونیاک، خاصیت بازی داشته و pH آن کم‌تر از ۷ است.  
 (ت) در هر میلی‌لیتر از محلول A،  $6/02 \times 10^{19}$  یون هیدرونیوم به صورت حل‌شده وجود دارد.  
 (ث) در صورت افزودن آب مقطر به این محلول‌ها، تفاوت غلظت یون هیدرونیوم در آن‌ها کم‌تر می‌شود.
- |       |       |
|-------|-------|
| ۱ (۱) | ۲ (۲) |
| ۳ (۳) | ۴ (۴) |

۲۵۷- ۱ لیتر محلول HCl با  $\text{pH} = 1$  را با مقدار کافی محلول سدیم هیدروکسید با  $\text{pH} = 12$  خنثی کرده و پس از اتمام فرایند خنثی‌سازی،  $55/0$  مول منیزیم سولفات را در محلول موردنظر حل می‌کنیم. غلظت یون منیزیم در محلول حاصل از این فرایند تقریباً برابر با چند ppm می‌شود؟ (چگالی همه محلول‌ها را برابر با  $1 \text{ g.mL}^{-1}$  در نظر بگیرید.  $(\text{S} = 32, \text{Mg} = 24, \text{O} = 16; \text{g.mol}^{-1})$ )

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ۱۲۰۰ (۱) | ۴۸۰۰ (۲) | ۱۳۲۰ (۳) | ۵۲۸۰ (۴) |
|----------|----------|----------|----------|

۲۵۸- با افزودن  $10$  میلی‌لیتر از محلول یک ترکیب با خاصیت اسیدی (HA) به  $90$  میلی‌لیتر آب مقطر، pH محلول به ۲ کاهش می‌یابد. برای خنثی شدن هر لیتر از محلول غلیظ اولیه این ترکیب اسیدی، چند گرم NaOH(s) لازم است؟  $(\text{Na} = 23, \text{O} = 16, \text{H} = 1; \text{g.mol}^{-1})$

- |       |       |        |        |
|-------|-------|--------|--------|
| ۱ (۱) | ۴ (۲) | ۱۰ (۳) | ۴۰ (۴) |
|-------|-------|--------|--------|
- (سراسری تهرانی ۹۷)

۲۵۹- چند مورد از عبارتهای داده‌شده درست هستند؟

- (آ) در محلول NaOH با  $\text{pH} = 11/3$ ، غلظت مولی یون هیدروکسید،  $4 \times 10^8$  برابر غلظت مولی یون هیدرونیوم است.  
 (ب) برای خنثی کردن  $10$  لیتر محلول HCl با  $\text{pH} = 2$ ، به  $0/1$  مول سدیم هیدروکسید خالص نیاز داریم.  
 (پ) رنگ گل‌های ادریسی که در خاک‌هایی با pH اسیدی می‌رویند، قرمز رنگ خواهد شد.  
 (ت) اگر  $K_a$  برای اسید ضعیف HA برابر  $10^{-5}$  باشد، pH محلول  $0/4$  مولار این اسید به تقریب برابر  $2/7$  می‌شود.

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ۱ (۱) | ۲ (۲) | ۳ (۳) | ۴ (۴) |
|-------|-------|-------|-------|



۲۶۰- pH فاضلاب خارج‌شده از یک کارخانه صنعتی، برابر  $2/7$  است. اگر چگالی فاضلاب خروجی از این کارخانه برابر با  $1/25 \text{ kg.L}^{-1}$  باشد، برای خنثی کردن هر تن از آن، به چند گرم سدیم هیدروکسید با خلوص  $40$  درصد نیاز داریم؟  $(\text{Na} = 23, \text{O} = 16, \text{H} = 1; \text{g.mol}^{-1})$

- |         |        |         |         |
|---------|--------|---------|---------|
| ۱۶۰ (۱) | ۸۰ (۲) | ۱۲۸ (۳) | ۱۲۰ (۴) |
|---------|--------|---------|---------|

۲۶۱- اگر غلظت یون هیدرونیوم در محلول اسید قوی HA،  $8 \times 10^9$  برابر غلظت یون هیدرونیوم در محلول باز قوی BOH باشد و هر میلی‌لیتر از محلول اسید HA توسط  $5$  میلی‌لیتر از محلول باز BOH به طور کامل خنثی شود، pH محلول اسید HA کدام است؟

- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| ۲/۷ (۱) | ۲/۳ (۲) | ۱/۷ (۳) | ۱/۳ (۴) |
|---------|---------|---------|---------|

۲۶۲- محلولی از هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 2$  را مطابق با تصویر مقابل، با پودر سدیم هیدروکسید مخلوط می‌کنیم. اگر سرعت ریختن پودر موردنظر ثابت باشد، نمودار تغییر pH محلول موجود در ظرف به چه صورت می‌شود؟



۲۶۳- pH دو لیتر محلول هیدروکلریک اسید  $0/01$  مولار، با افزودن چند گرم پتاسیم هیدروکسید با جرم مولی  $56 \text{ g.mol}^{-1}$ ، به تقریب دو برابر می‌شود؟ (سراسری ریاضی ۹۳)

- |         |          |       |          |
|---------|----------|-------|----------|
| ۰/۵ (۱) | ۰/۵۵ (۲) | ۱ (۳) | ۱/۱۱ (۴) |
|---------|----------|-------|----------|

۲۶۴- کدام یک از مطالب زیر درست است؟

- (۱) مجموع غلظت یون هیدرونیوم و یون هیدروکسید در محلولی با  $\text{pH} = 8$ ،  $5/5$  برابر غلظت این یون‌ها در یک نمونه آب خالص است.  
 (۲) یک لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 2$ ، با  $200$  میلی‌لیتر محلول سدیم هیدروکسید با  $\text{pH} = 12/3$  خنثی می‌شود.  
 (۳) استیک اسید، ساده‌ترین عضو خانواده کربوکسیلیک اسیدها بوده و همانند نیترو اسید، در دسته اسیدهای تک‌پروتون قرار دارند.  
 (۴) در صورت حل کردن  $2/24 \times 10^{-3}$  میلی‌لیتر گاز هیدروژن برمید در  $10$  لیتر آب خالص، pH محلول موردنظر کم‌تر از ۷ می‌شود.



۲۶۵- به ۲۰۰ mL از محلول  $0.01 \text{ mol.L}^{-1}$  اسید ضعیف HA با  $\text{pH} = 4$ ، مقداری محلول  $0.05 \text{ mol.L}^{-1}$  سدیم هیدروکسید اضافه می‌کنیم. اگر طی این فرایند،  $\text{pH}$  محلول به اندازه  $2/3$  واحد افزایش پیدا کرده باشد، حجم محلول سدیم هیدروکسید اضافه شده برابر با چند mL است؟ (ترکیب NaA به حالت رسوب درآمده و از محلول خارج می‌شود).

- (۱) ۱۰۰ (۲) ۲۰۰ (۳) ۳۰۰ (۴) ۴۰۰

۲۶۶- کدام موارد از مطالب زیر درست است؟

- (آ) با افزودن مقدار اندکی سدیم هیدروژن کربنات به آب خالص، مقدار  $[\text{OH}^-][\text{H}^+]$  در محلول مورد نظر افزایش پیدا می‌کند.  
 (ب) فرمول مولکولی یک صابون جامد که گروه R سیرشده آن دارای ۱۷ اتم کربن است، به صورت  $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2\text{Na}$  می‌شود.  
 (پ) اسید مورد نیاز برای رساندن  $\text{pH}$  یک محلول از ۳ به ۲، بیشتر از اسید مورد نیاز برای رساندن  $\text{pH}$  آن محلول از ۶ به ۵ است.  
 (ت) هر گرم سدیم هیدروکسید، در مقایسه با هر گرم پتاسیم هیدروکسید، تأثیر بیشتری بر افزایش  $\text{pH}$  یک محلول اسیدی خاص دارد.

- (۱) (ب) و (ت) (۲) (پ) و (ت) (۳) (آ) و (پ) (۴) (آ) و (ب)

۲۶۷- اگر  $\text{K}_a$  اسید HB بیشتر از  $\text{K}_a$  اسید HA باشد، کدام یک از مطالب زیر در رابطه با محلول‌هایی با غلظت و حجم برابر از این مواد درست است؟

- (۱) پس از افزودن مول‌های برابر از هر ماده به محلول خودش،  $\text{K}_a$  محلول HB در مقایسه با محلول دیگر به مقدار بیشتری افزایش می‌یابد.  
 (۲) جرم NaOH مورد نیاز برای خنثی کردن محلول HB، بیشتر از جرم NaOH مورد نیاز برای خنثی کردن محلول HA است.  
 (۳) اگر عناصر A و B هالوژن باشند، خاصیت نافلزی عنصر A در مقایسه با خاصیت نافلزی عنصر B بیشتر است.  
 (۴)  $\text{pH}$  محلول اسید HB در مقایسه با  $\text{pH}$  محلول HA به  $\text{pH}$  یک نمونه خالص از آب نزدیک‌تر است.

۲۶۸- در صورتی که ۱ mL از محلول غلیظ اسید قوی HA با چگالی  $2/5 \text{ g.mL}^{-1}$  تا ۱۰۰ mL رقیق و به آن  $16 \text{ g}$  سدیم هیدروکسید افزوده شود، محلولی با  $\text{pH} = 2$  حاصل می‌شود. درصد جرمی محلول اسید اولیه کدام است؟ ( $\text{HA} = 150, \text{NaOH} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$ ) (سراسری تهری ۹۳)

- (۱) ۶ (۲) ۲۴ (۳) ۳۰ (۴) ۳۶

۲۶۹- دو محلول مجزا، یکی با  $\text{pH} = 12$  و دیگری با  $\text{pH} = 12/7$  در اختیار داریم. اگر حجم هیدروکلریک اسید مورد نیاز برای خنثی کردن کامل این محلول‌ها با یکدیگر برابر باشد،  $\text{pH}$  محلول حاصل از مخلوط کردن این دو محلول با یکدیگر تقریباً چه قدر می‌شود؟ ( $\log 5 = 0/7, \log 3 = 0/5$ )

- (۱)  $12/2$  (۲)  $12/3$  (۳)  $12/5$  (۴)  $12/6$

### واکنش‌های اسیدها و بازها با سایر مواد

۲۷۰- هیدروکلریک اسید، براساس معادله موازنه‌نشده  $\text{MnO}_2(\text{s}) + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{MnCl}_2(\text{aq}) + \text{Cl}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ، با منگنز (IV) اکسید وارد واکنش می‌شود. ۱۶ لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 0/7$ ، با چند گرم منگنز (IV) اکسید به طور کامل واکنش می‌دهد؟ ( $\text{Mn} = 55, \text{O} = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ )

- (۱)  $46/4$  (۲)  $92/8$  (۳)  $69/6$  (۴)  $139/2$

۲۷۱- دو لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 1/7$ ، با چند میلی لیتر محلول  $0/5$  مولار نقره نیترات به طور کامل واکنش می‌دهد و طی این فرایند، چند گرم رسوب تولید می‌شود؟ ( $\text{Ag} = 108, \text{Cl} = 35/5 \text{ g.mol}^{-1}$ )

- (۱)  $5/74 - 80$  (۲)  $5/74 - 40$  (۳)  $2/87 - 80$  (۴)  $2/87 - 40$

۲۷۲- به ۱۰ mL محلول ۲ مولار HCl، آب مقطر اضافه می‌کنیم تا حجم آن به یک لیتر برسد. ۱۰۰ میلی لیتر از این محلول، با چند میلی گرم کلسیم کربنات خنثی می‌شود؟ ( $\text{Ca} = 40, \text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ ) (سراسری تهری فارج از کشور ۹۵)

- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۱۰۰ (۴) ۲۰۰

۲۷۳- چند مورد از مطالب زیر، در رابطه با تصاویر مقابل که مربوط به واکنش یک قطعه فلز منیزیم با نمونه‌هایی از باران اسیدی و باران معمولی است، درست می‌باشند؟

- (آ) طی این واکنش‌ها، هر اتم منیزیم دو الکترون از دست داده و گاز اکسیژن نیز تولید می‌شود.  
 (ب) سرعت تولید گاز در ظرف محتوی باران اسیدی، بیشتر از سرعت تولید گاز در ظرف دیگر است.  
 (پ) قبل از شروع واکنش، رسانایی الکتریکی محلول موجود در ظرف A بیشتر از محلول ظرف B است.

- (ت) از رسوب تولیدشده در ظرف A، می‌توان برای به دام انداختن گاز کربن دی‌اکسید تولیدشده در نیروگاه‌ها استفاده کرد.  
 (ث) محلول ظرف B، طی انحلال آلایندگی حاصل از سوختن سوخت‌های فسیلی و فعالیت آتشفشان‌ها در آب حاصل می‌شود.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۷۴- اگر به ۲۵ میلی لیتر محلول  $0/2$  مولار هیدروکلریک اسید، ۲۵ میلی لیتر محلول با غلظت ۳۴ گرم بر لیتر نقره نیترات اضافه شود، در پایان واکنش،  $\text{pH}$  محلول کدام است و محلول به دست آمده با چند میلی گرم سدیم هیدروکسید خنثی می‌شود؟ (رسوب خصلت اسیدی ندارد؛  $\text{NaOH} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$ ) (سراسری تهری ۹۵)

- (۱)  $40, 3$  (۲)  $40, 2$  (۳)  $20, 3$  (۴)  $20, 2$



۲۷۵- اگر ۱۱/۲ میلی لیتر گاز هیدروژن کلرید در شرایط STP در ۲۵ mL آب حل شود، pH محلول به تقریب کدام است و هر میلی لیتر از این محلول با چند میلی گرم کلسیم کربنات واکنش کامل می دهد؟ (حجم محلول ثابت و برابر حجم اولیه آن فرض شود). ( $\text{Ca} = 40, \text{O} = 16, \text{C} = 12; \text{g.mol}^{-1}$ )


- (سراسری ریاضی خارج از کشور ۹۵)
- ۱، ۱/۷ (۱)      ۲، ۱/۷ (۲)
- ۲، ۱/۳ (۳)      ۱، ۱/۳ (۴)

۲۷۶- ۲۰۰ mL محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 2$ ، با چند گرم کلسیم کربنات ۲۵٪ خالص به طور کامل واکنش می دهد و اگر بازده درصدی انجام این واکنش برابر ۲۵٪ باشد، چند mL گاز کربن دی اکسید در شرایط STP طی این فرایند تولید می شود؟ ( $\text{Ca} = 40, \text{O} = 16, \text{C} = 12; \text{g.mol}^{-1}$ )

- ۵/۶ - ۰/۴ (۱)      ۵/۶ - ۰/۱ (۲)      ۱۱/۲ - ۰/۴ (۳)      ۱۱/۲ - ۰/۱ (۴)

۲۷۷- نمودارهای زیر، در رابطه با واکنش مقدار کافی از کلسیم کربنات جامد با مقداری از محلول هیدروکلریک اسید (در چهار ظرف جداگانه) است. با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با این محلول ها، می توان نمودار ..... را به واکنش با محلول ..... و نمودار ..... را به واکنش با محلول ..... نسبت داد.

میزان  $\text{CO}_2$  برآیند




شماره محلول	حجم محلول	دما	pH
I	۲۰۰ mL	۲۰ °C	۱/۳
II	۴۰۰ mL	۱۰ °C	۱/۶
III	۲۰۰ mL	۳۰ °C	۱
IV	۲۰۰ mL	۱۰ °C	۱/۳





- III - A - I - D (۴)      IV - C - III - A (۳)      IV - D - II - B (۲)      II - A - I - B (۱)

۲۷۸- یک قطعه کلسیم کربنات جامد را در شرایط استاندارد در ۵۰۰ میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 1$  می اندازیم. اگر پس از گذشتن ۱۳۵ ثانیه از ابتدای واکنش، pH محلول موردنظر به اندازه دو واحد افزایش پیدا کند، سرعت متوسط تولید گاز کربن دی اکسید در طول این بازه زمانی برابر با چند مول بر دقیقه است؟

- ۰/۰۰۸ (۴)      ۰/۰۱ (۳)      ۰/۰۱۸ (۲)      ۰/۰۱۱ (۱)



۲۷۹- تغییر غلظت  $\text{A(aq)}$  در واکنش  $\text{A(aq)} + 2\text{X(aq)} + \text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{D(aq)}$  در محلول با غلظت ۱ مولار  $\text{HCl}$ ، ۲ مولار  $\text{X(aq)}$  و ۱ مولار  $\text{A(aq)}$  به صورت شکل روبه رو است. نمودار تغییر pH این محلول، به کدام صورت است؟ (D خصلت اسیدی و بازی ندارد). (سراسری ریاضی ۹۵)



۲۸۰- فلز کلسیم براساس معادله  $2\text{HCl(aq)} + \text{Ca(s)} \rightarrow \text{CaCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$  با محلول هیدروکلریک اسید واکنش می دهد. یک قطعه ۴۰ گرمی از فلز کلسیم را در ۴ لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 1$  می اندازیم. در لحظه ای که pH این محلول به ۲ می رسد، چند درصد از جرم قطعه کلسیم کاسته شده است و تا این لحظه از واکنش، چند لیتر گاز هیدروژن با چگالی  $0.08 \text{ g.L}^{-1}$  تولید شده است؟ ( $\text{Ca} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$ )

- ۴/۵ - ۱۸ (۴)      ۹ - ۳۶ (۳)      ۹ - ۱۸ (۲)      ۴/۵ - ۳۶ (۱)

۲۸۱- پتاسیم پرمنگنات براساس واکنش موازنه نشده  $\text{KMnO}_4(\text{s}) + \text{HCl(aq)} \rightarrow \text{MnCl}_2(\text{aq}) + \text{Cl}_2(\text{g}) + \text{KCl(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)}$  هیدروکلریک اسید واکنش می دهد. مقداری پتاسیم پرمنگنات را در دو لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 1$  می اندازیم. اگر پس از گذشتن ۳۰ ثانیه، pH محلول به ۱/۷ برسد، سرعت متوسط تولید گاز کلر در طول این بازه زمانی برابر چند  $\text{mol.min}^{-1}$  است؟

- ۰/۲ (۴)      ۰/۱۵ (۳)      ۰/۱ (۲)      ۰/۰۵ (۱)



۲۸۲- مقداری فلز آلومینیم در یک ظرف دارای ۲ لیتر محلول ۱ مولار سدیم هیدروکسید انداخته شده و طبق معادله (موازنه‌نشده)  $\text{Al(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Al(OH)}_4^-(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ ، وارد واکنش شده است. اگر سرعت متوسط تولید گاز  $\text{H}_2$  برابر  $50 \text{ mL.s}^{-1}$  باشد، pH محلول در ثانیه چندم پس از آغاز واکنش، به ۱۳ می‌رسد؟ (حجم مولی گازها در شرایط واکنش، برابر ۲۵ L است. فرض کنید فرآورده محلول در آب، خاصیت بازی چندانی ندارد.)

۱۵۰ (۱) ۶۷۵ (۲) ۱۱۰۰ (۳) ۱۳۵۰ (۴)

### پاک‌کننده‌های خورنده

۲۸۳- کدام یک از مطالب زیر درست است؟

- برای بازکردن راه لوله‌های مسدودشده توسط اسیدهای چرب، از پاک‌کننده‌هایی با خاصیت اسیدی استفاده می‌شود.
- در واکنش بین هیدروکلریک اسید و سود سوزآور، مقداری گاز هیدروژن به همراه محلول سدیم کلرید تولید می‌شوند.
- pH و قدرت بازی محلول‌های شیشه‌پاک‌کن، بیشتر از pH و قدرت بازی محلول‌های لوله‌بازکن است.
- رسانایی الکتریکی محلول آمونیاک در شرایط یکسان، به طور چشمگیری کم‌تر از رسانایی الکتریکی محلول پتاس سوزآور است.

۲۸۴- چه تعداد از عبارتهای زیر درست است؟

- محلول هیدروسیانیک اسید، از مقداری یون‌های آب‌پوشیده و شمار زیادی از مولکول‌های یونیده‌نشده تشکیل شده است.
- از محلول غلیظ پتاس سوزآور می‌توان برای بازکردن لوله‌های مسدودشده توسط اسیدهای چرب استفاده کرد.
- پ گل‌های ادریسی در خاک‌هایی که pH آن بیشتر از ۷ است، به رنگ قرمز می‌رویند.
- در نظریه آرنیوس، همه موادی که خاصیت بازی دارند، در ساختار خود دارای یون‌های هیدروکسید هستند.

۱ (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۲۸۵- کدام یک از عبارتهای زیر نادرست است؟

- در هر میلی‌لیتر محلول آمونیاک با  $\text{pH} = 9$ ،  $10^{-8}$  مول یون هیدروکسید به صورت آب‌پوشیده وجود دارد.
- محلول سدیم هیدروژن کربنات طبق معادله  $\text{HCl(aq)} + \text{NaHCO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl(aq)} + \text{H}_2\text{CO}_3(\text{s})$  با هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهد.
- کاغذ pH در صورت آغشته‌شدن با محلول استیک اسید، تغییر رنگ داده و به رنگ قرمز درمی‌آید.
- فرآورده حاصل از واکنش میان اسیدهای چرب و محلول سود سوزآور، خود نوعی ماده پاک‌کننده محسوب می‌شود.

۲۸۶- ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول سدیم هیدروکسید ۰/۱۵ مولار با ۸۰۰ میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 2$  مخلوط می‌کنیم. نسبت میان غلظت یون هیدروژن به یون هیدروکسید در محلول حاصل از این فرایند، چند برابر مقدار این نسبت در محلول هیدروکلریک اسید اولیه است؟

۴۰ (۱) ۰/۰۲۵ (۲) ۴ (۳) ۰/۲۵ (۴)

۲۸۷- کدام مورد از مطالب زیر درست است؟

- رسانایی الکتریکی محلول سدیم هیدروکسید با  $\text{pH} = 11$ ، بیشتر از رسانایی الکتریکی محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 2$  است.
- گاز دی‌نیتروژن پنتاکسید، یک اسید آرنیوس است که افزودن آن به آب، سبب کاهش pH آب می‌شود.
- حاصل‌ضرب غلظت یون‌های  $\text{OH}^-$  و  $\text{H}_3\text{O}^+$  در یک محلول در دمای  $0^\circ\text{C}$ ، برابر با  $10^{-14} \text{ mol}^2 \cdot \text{L}^{-2}$  است.
- همه شوینده‌های خورنده، خاصیت بازی داشته و از آن‌ها برای زدودن آلودگی‌هایی با خاصیت اسیدی استفاده می‌شود.

۲۸۸- چند مورد از عبارتهای داده‌شده نادرست هستند؟

- واکنش میان محلول‌های  $\text{HCl(aq)}$  و  $\text{NaOH(aq)}$  را می‌توان به صورت  $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$  نشان داد.
- فرآورده واکنش میان  $\text{NaOH(aq)}$  و  $\text{RCOOH(s)}$ ، همانند سدیم هیدروکسید مصرف‌شده، خاصیت بازی دارد.
- از صابون‌های گوگرددار، برای از بین بردن جوش‌های صورت و قارچ‌های پوستی استفاده می‌شود.
- برای زدودن رسوب تشکیل‌شده بر روی دیواره کتری و دیگ‌های بخار، باید از پاک‌کننده‌های خورنده استفاده کرد.

۱ (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۲۸۹- دیواره یک لوله، توسط یک توده ۶۴۰ گرمی از مولکول‌های زیر مسدود شده است. برای حل کردن کل ترکیب موردنظر و بازکردن مسیر این لوله، به ..... میلی‌لیتر محلول ۲۰ درصد جرمی سدیم هیدروکسید با چگالی  $1/25 \text{ g.mL}^{-1}$  نیاز است و طی این فرایند، ..... گرم پاک‌کننده صابونی تشکیل می‌شود. ( $\text{Na} = 23, \text{O} = 16, \text{H} = 1; \text{g.mol}^{-1}$ )



۶۹۵ - ۴۰۰ (۴) ۷۰۵ - ۲۰۰ (۳) ۷۰۵ - ۴۰۰ (۲) ۶۹۵ - ۲۰۰ (۱)



داروهای ضداسید معده‌ای

۲۹۰- کدام یک از عبارتهای زیر نادرست است؟

- (۱) در صورت افزودن مقداری سدیم هیدروکسید به مخلوط ناهمگن آب و اسیدهای چرب، یک مخلوط همگن ایجاد می‌شود.
- (۲) دیواره معده، فقط توانایی تولید یون هیدرونیوم را دارد و قادر به جذب این یون‌ها از محتویات درون معده نیست.
- (۳) افزودن جوش شیرین به پاک‌کننده‌ها، قدرت زدودن چربی توسط این پاک‌کننده‌ها را افزایش می‌دهد.
- (۴) افزایش مقدار اسید موجود در معده، سبب درد، التهاب و گاهی خونریزی معده انسان می‌شود.

۲۹۱- چه تعداد از عبارتهای زیر درست هستند؟

- (آ) در بدن یک انسان بالغ، روزانه بین ۲ تا ۳ لیتر شیره معده، توسط غدد موجود در دیواره معده تولید می‌شود.
- (ب) در شرایط یکسان، رسانایی الکتریکی محلول شیشه پاک‌کن بیشتر از محلول لوله‌بازکن است.
- (پ) pH اسید تولیدشده توسط غدد موجود در دیواره معده تقریباً برابر با ۳ است.
- (ت) طی واکنش محلول سدیم هیدروژن کربنات با شیره معده، مولکول‌های کربن دی‌اکسید تولید می‌شوند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۹۲- کدام یک از مطالب زیر درست است؟

- (۱) pH محتویات معده در هنگام استراحت، بیشتر از pH اسید تولیدشده توسط غده‌های معده‌ای در هنگام غذا خوردن است.
- (۲) آلومینیم هیدروکسید، همانند منیزیم هیدروکسید، سبب کاهش pH محتویات معده انسان می‌شود.
- (۳) سدیم هیدروژن کربنات، یک ترکیب اسیدی است و با انحلال در آب، سبب کاهش pH محلول موردنظر می‌شود.
- (۴) یک ماده غذایی با pH = ۴، خاصیت اسیدی دارد و مصرف آن، سبب کاهش pH محتویات معده انسان می‌شود.


۲۹۳- غلظت یون سدیم در یک نمونه از محلول سدیم هیدروژن کربنات با چگالی  $1 \text{ g.mL}^{-1}$ ، برابر  $460 \text{ ppm}$  است. هر لیتر از این محلول با چند میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 1$  واکنش می‌دهد و طی این فرایند چند میلی‌لیتر فراورده گازی در شرایط استاندارد تولید می‌شود؟ ( $\text{Na} = 23 \text{ g.mol}^{-1}$ )

(۱) ۲۲۴ - ۲۰۰ (۲) ۲۲۴ - ۱۰۰ (۳) ۴۴۸ - ۲۰۰ (۴) ۴۴۸ - ۱۰۰

۲۹۴- هر میلی‌لیتر از یک نمونه ضداسید معده‌ای با چگالی  $1/5 \text{ g.mL}^{-1}$  که درصد جرمی آلومینیم هیدروکسید در آن برابر ۳۹٪ است، با چند میلی‌لیتر اسید معده با  $\text{pH} = 1/5$  به طور کامل واکنش می‌دهد؟ ( $\text{Al} = 27, \text{O} = 16, \text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ )

(۱) ۲۵۰ (۲) ۷۵۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۳۰۰

۲۹۵- آسپرین یک داروی اسیدی با ساختار مقابل است. pH یک نمونه از محلول آبی آسپرین با  $K_a = 4 \times 10^{-4}$ ، برابر ۴ است.



در هر لیتر از این محلول، چند میلی‌گرم آسپرین حل شده است؟ ( $\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ )

(۱) ۴۵ (۲) ۶۷/۵ (۳) ۹۰ (۴) ۲۲/۵

۲۹۶- معده یک فرد در حالت استراحت، محتوی ۰/۸ لیتر محلول اسیدی با  $\text{pH} = 2/3$  است. با مصرف ۲۰۰ میلی‌لیتر از یک نمونه ضداسید معده‌ای با چگالی  $1 \text{ g.mL}^{-1}$  که شامل منیزیم هیدروکسید می‌شود، pH محتویات معده این فرد به اندازه ۰/۴ واحد افزایش می‌یابد. غلظت منیزیم هیدروکسید در این نمونه از ضداسید برابر چند ppm است؟ ( $\text{Mg} = 24, \text{O} = 16, \text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ )

(۱) ۲۹۰ (۲) ۵۸۰ (۳) ۳۴۵ (۴) ۱۴۵

۲۹۷- مجموع درصد جرمی آلومینیم هیدروکسید و منیزیم هیدروکسید موجود در یک نمونه از ضداسیدهای معده‌ای با چگالی  $1/2 \text{ g.mL}^{-1}$ ، برابر با ۳۰٪ است. اگر ۲۰ میلی‌لیتر از این ضداسید بتواند با ۳/۶ لیتر از اسید معده با  $\text{pH} = 1/15$  به طور کامل واکنش بدهد، شمار مول‌های منیزیم هیدروکسید موجود در این ضداسید، چند برابر شمار مول‌های آلومینیم هیدروکسید موجود در آن است؟ ( $\text{Al} = 27, \text{Mg} = 24, \text{O} = 16, \text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ )

(۱) ۲/۵ (۲) ۴ (۳) ۹ (۴) ۵

۲۹۸- چند مورد از عبارتهای داده‌شده درست است؟

- (آ) شمار پیوندهای اشتراکی موجود در ساختار یون استات، ۱/۵ برابر شمار این پیوندها در یون هیدروژن کربنات است.
- (ب) از ضداسیدهای معده‌ای می‌توان برای کاهش عوارض جانبی ایجادشده توسط داروهای اسیدی استفاده کرد.
- (پ) غلظت یون هیدرونیوم در محلول‌های شیشه پاک‌کن کم‌تر از غلظت این یون در محلول‌های لوله‌بازکن است.
- (ت) با افزودن آب خالص به یک نمونه از شیر ترش‌شده، غلظت یون هیدروکسید در محلول افزایش می‌یابد.
- (ث) pH محلول سدیم هیدروژن کربنات، برخلاف محلول آمونیاک و محلول لوله‌بازکن، کم‌تر از ۷ است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴



۴ در محلول‌هایی با غلظت برابر از این اسیدها، مولکول‌های HA به مقدار بیشتری نسبت به مولکول‌های HB یونیده می‌شوند و به همین خاطر، مقدار غلظت یون  $A^-$  در محلول اسید HA بیشتر از مقدار غلظت یون  $B^-$  در محلول اسید HB می‌شود.

۱۷۱- **گزینه ۱** در محلول تصویر موردنظر، ۷ مولکول HF و ۳ یون  $F^-$  و ۳ یون  $H_3O^+$  وجود دارد. بر این اساس، در محلول موردنظر، ۰/۱۷۵ مول HF و ۰/۰۷۵ مول یون  $F^-$  وجود دارد. به عبارت دیگر، مجموعاً ۰/۲۵ مول گاز هیدروژن فلئوئورید در محلول حل شده است.

محلول هیدروفلئوئوریک اسید براساس معادله  $Mg(s) + 2HF(aq) \rightarrow MgF_2(aq) + H_2(g)$  با فلز منیزیم واکنش می‌دهد. ابتدا شمار مول‌های گاز هیدروژن حاصل و پس از آن، حجم گاز تولیدشده را محاسبه می‌کنیم.

$$? \text{ mol } H_2 = 0.25 \text{ mol } HF \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2 \text{ mol } HF} = 0.125 \text{ mol}$$

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{n_1 \cdot T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{n_2 \cdot T_2} \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = \frac{P_2 \cdot V_2 \cdot T_1}{P_1 \cdot V_1 \cdot T_2} \Rightarrow \frac{0.125}{1} = \frac{0.5 \times V_2 \times 273}{1 \times 22 \cdot 4 \times (273 + 78)} \Rightarrow V_2 = 7.2 \text{ L}$$

۱۷۲- **گزینه ۳**

## یادآوری

فلزهای مختلف، میزان واکنش‌پذیری متفاوتی داشته و بسته به میزان واکنش‌پذیری خود، با محلول‌های اسیدی با شدت‌های متفاوتی واکنش می‌دهند. به عنوان مثال، واکنش‌پذیری آلومینیم بیشتر از روی است و به همین خاطر در شرایط یکسان، فلز آلومینیم با شدت بیشتری با محلول‌های اسیدی واکنش می‌دهد.


همان‌طور که مشخص است، در واکنش‌های شماره ۱ و ۵، غلظت اسید برابر ۲ مول بر لیتر است؛ در حالی که غلظت اسیدهای به کار رفته در سایر واکنش‌ها برابر با ۱ مول بر لیتر است؛ پس حجم نهایی این گاز تولیدشده در واکنش‌های ۱ و ۵ باید دو برابر حجم گاز تولیدشده در سایر واکنش‌ها باشد؛ بنابراین هر یک از نمودارهای A و B متعلق به یکی از واکنش‌های ۱ و ۵ هستند. از آن‌جا که واکنش‌پذیری آلومینیم بیشتر از واکنش‌پذیری روی است، این فلز با سرعت بیشتری نسبت به فلز روی با محلول اسیدی واکنش داده و به همین خاطر، نمودار A را به واکنش ۵ و نمودار B را به محلول ۱ نسبت می‌دهیم.

از میان واکنش‌های ۲، ۳ و ۴، فلز به کار رفته در واکنش ۳ واکنش‌پذیری بیشتری دارد و اسید به کار رفته در این واکنش نیز  $K_a$  بیشتری دارد؛ پس سرعت انجام شدن این فرایند بیشتر از سایر واکنش‌ها بوده و نمودار C متعلق به این واکنش است. در مقایسه بین واکنش‌های ۲ و ۴، چون فلز به کار رفته در واکنش ۲ واکنش‌پذیری بیشتری دارد، پس نمودار D را به واکنش ۲ و نمودار E را به واکنش ۴ نسبت می‌دهیم.

۱۷۳- **گزینه ۴** با توجه به غلظت یون هیدرونیوم، غلظت استیک اسید حل شده در محلول (M) را محاسبه می‌کنیم.

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_a \cdot M} \Rightarrow 2 \times 10^{-4} = \sqrt{4 \times 10^{-6} \times M} \Rightarrow 4 \times 10^{-8} = 4 \times 10^{-6} \times M \Rightarrow M = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

با توجه به غلظت مولی اسید در محلول، مشخص می‌شود که درجه یونش استیک اسید برابر با ۰/۰۲ است.



معادله واکنش انجام‌شده به صورت مقابل است.

براساس معادله واکنش، جرم فلز روی مورد نیاز را محاسبه می‌کنیم.

$$? \text{ mg } Zn = 500 \text{ mL محلول} \times \frac{1 \text{ L محلول}}{1000 \text{ mL محلول}} \times \frac{10^{-2} \text{ mol اسید}}{1 \text{ L محلول}} \times \frac{1 \text{ mol Zn}}{2 \text{ mol اسید}} \times \frac{65 \text{ g Zn}}{1 \text{ mol Zn}} \times \frac{1000 \text{ mg Zn}}{1 \text{ g Zn}} = 162.5 \text{ mg}$$

۱۷۴- **گزینه ۳** عبارت‌های ۱، ۲ و ۳ درست است.

بررسی چهار عبارت:

۱ با استفاده از مقیاس pH می‌توان خاصیت اسیدی محلول‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

۲ باران‌های معمولی، دارای کربنیک اسید ( $H_2CO_3$ ) هستند. این اسید طی انحلال گاز  $CO_2$  موجود در هوا در آب باران حاصل می‌شود.

۳ به کمک رنگ کاغذ pH می‌توان مقدار pH تقریبی محلول‌های مختلف را مشخص کرد.

۴ شیر ترش شده محتوی لاکتیک اسید بوده و خاصیت اسیدی دارد. pH این محلول کم‌تر از ۷ است.

۱۷۵- **گزینه ۲** محتویات معده انسان خاصیت اسیدی داشته و pH آن‌ها بین ۱/۶ تا ۱/۸ است؛ در حالی که محتویات روده انسان خاصیت بازی دارند و pH تقریبی آن‌ها برابر ۸/۵ است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱ گل‌های ادریسی در خاک‌های بازی به رنگ قرمز درمی‌آیند در حالی که رنگ کاغذ pH در این خاک‌ها آبی می‌شود.

۲ در رابطه با این محلول داریم:  $pH = -\log[H_3O^+] = -\log(5 \times 10^{-3}) = -(\log 5 + \log 10^{-3}) = -(0.7 - 3) = 2.3$

۴ صابون‌ها خاصیت بازی دارند و با انحلال آن‌ها در آب خالص، pH محلول افزایش پیدا می‌کند.



۱۷۶- گزینه ۳ عبارت‌های **ب**، **پ** و **ت** درست هستند.

بررسی چهار عبارت:

**ا** هیدرویدیک اسید (HI) یک اسید قوی است و به هنگام انحلال در آب، طی یک واکنش یک‌طرفه و غیرتعادلی، یونش پیدا می‌کند؛ در حالی که نیترو اسید ( $\text{HNO}_3$ ) یک اسید ضعیف است و پس از انحلال در آب، طی یک فرایند تعادلی یونش پیدا می‌کند.

**ب** سدیم اکسید یک اکسید فلزی و بازی است و pH محلول آن همانند pH خون انسان بزرگ‌تر از ۷ است.

**پ** از کمیت pH برای پرهیز از بیان غلظت‌های کم و یا خیلی کم یون هیدرونیوم در محلول‌ها استفاده می‌شود.

**ت** سفیدکننده‌ها در دسته پاک‌کننده‌های خورنده قرار می‌گیرند. این مواد از نظر شیمیایی فعال بوده و خاصیت خوردگی دارند.

۱۷۷- گزینه ۴ هیدروسیانیک یک اسید ضعیف با  $K_a = 4/9 \times 10^{-10}$  است؛ در حالی که هیدروبرمیک اسید یک اسید قوی با  $K_a$  بسیار بزرگ است. با توجه به  $K_a$  این اسیدها، در شرایط یکسان غلظت یون هیدرونیوم در محلول هیدروبرمیک اسید بیشتر بوده و این محلول pH کم‌تری دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

**۱** غلظت یون هیدرونیوم را در محلول A برابر ۲M مول بر لیتر و در محلول B برابر M مول بر لیتر در نظر می‌گیریم.

$$\text{pH}_B - \text{pH}_A = -\log[\text{H}_B^+] - (-\log[\text{H}_A^+]) = \log[\text{H}_A^+] - \log[\text{H}_B^+] = \log \frac{[\text{H}_A^+]}{[\text{H}_B^+]} = \log \left( \frac{2M}{M} \right) = \log 2 = 0/3$$

**۲** از آن‌جا که  $K_a$  نیتریک اسید بیشتر از  $K_a$  نیترو اسید است، در شرایط یکسان یک قطعه فلز منیزیم با محلول نیتریک اسید با شدت بیشتری واکنش می‌دهد.

**۳** غلظت یون هیدرونیوم با غلظت یون  $\text{HCOO}^-$  در این محلول برابر بوده و از غلظت مولکول‌های  $\text{HCOOH}$  کم‌تر است.

۱۷۸- عبارت‌های **ا**، **ب** و **ت** نادرست هستند.

بررسی چهار عبارت:

**ا** صابون‌های مراغه فاقد افزودنی‌های شیمیایی هستند و به دلیل خاصیت بازی مناسب، از آن‌ها برای شستن موهای چرب استفاده می‌شود.



**ب** چون  $K_a$  نیترو اسید بیشتر از  $K_a$  استیک اسید است، در شرایط یکسان در محلول این اسید، شمار یون‌های بیشتری تولید شده و رسانایی این محلول بیشتر از محلول استیک اسید است.

**پ** به هر اندازه که یک پاک‌کننده صابونی بتواند مقدار بیشتری از آلاینده‌ها را پاک کند، قدرت پاک‌کنندگی بیشتری دارد.

**ت** در رابطه با این محلول داریم:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-11/5} = 10^{-2} \times 10^{-1} = 3 \times 10^{-12} \text{ mol.L}^{-1}$$

گازهای دی‌نیتروژن پنتاکسید و هیدروژن کلرید براساس معادله‌های زیر با آب واکنش می‌دهند:




چون حجم‌های برابری از گازهای HCl و  $\text{N}_2\text{O}_5$  در آب حل شده است، مقدار یون  $\text{H}^+$  تولیدشده در محلول نیتریک اسید، دو برابر مقدار یون  $\text{H}^+$  تولیدشده در محلول هیدروکلریک است. در این شرایط، اگر غلظت یون هیدروژن در محلول HCl برابر M مولار باشد، غلظت این یون در محلول نیتریک اسید برابر ۲M مول بر لیتر می‌شود.

$$\text{pH محلول نیتریک اسید} - \text{pH محلول هیدروکلریک اسید} = -\log M - (-\log 2M) = \log 2M - \log M = \log \frac{2M}{M} = \log 2 = 0/3$$

چون غلظت یون هیدرونیوم در محلول هیدروکلریک اسید کم‌تر است، پس این محلول pH بیشتری خواهد داشت.

۱۸۰- گزینه ۴ واکنش انجام‌شده در محلول به صورت مقابل است:



$$? \text{ mol H}^+ = 8/96 \text{ L HBr} \times \frac{1 \text{ mol HBr}}{22/4 \text{ L HBr}} \times \frac{1 \text{ mol H}^+}{1 \text{ mol HBr}} = 0/4 \text{ mol} \Rightarrow [\text{H}^+] = \frac{\text{مول H}^+}{\text{حجم محلول}} = \frac{0/4 \text{ mol}}{1/6 \text{ L}} = 0/24 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \Rightarrow \text{pH} = -\log(0/24) = -\log\left(\frac{1}{4}\right) = -\log 2^{-2} = 2 \times \log 2 = 2 \times 0/3 = 0/6$$

۱۸۱- گزینه ۱ گام اول: غلظت یون هیدروژن را محاسبه می‌کنیم:

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-3/7} = 2 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

گام دوم: با توجه به مقدار  $\alpha$  غلظت اسید حل‌شده در محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$[\text{H}^+] = \alpha \cdot M \Rightarrow 2 \times 10^{-4} = 0/04M \Rightarrow M = 5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

گام سوم: حجم گاز HA حل‌شده در این محلول را براساس غلظت اسید به دست می‌آوریم.

$$? \text{ L HA} = 2 \text{ L محلول} \times \frac{5 \times 10^{-3} \text{ mol HA}}{1 \text{ L محلول}} \times \frac{22/4 \text{ L HA}}{1 \text{ mol HA}} = 0/224 \text{ L}$$

۱۸۲- گزینه ۲

ابتدا شمار مول‌های یون فلئورید موجود در هر لیتر از این محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$? \text{ mol F}^- = 1 \text{ L محلول} \times \frac{1000 \text{ mL محلول}}{1 \text{ L محلول}} \times \frac{1 \text{ g محلول}}{1 \text{ mL محلول}} \times \frac{570 \text{ g F}^-}{10^6 \text{ g محلول}} \times \frac{1 \text{ mol F}^-}{19 \text{ g F}^-} = 0.03 \text{ mol}$$

چون در هر لیتر از این محلول، ۰/۰۳ مول یون فلئورید وجود دارد، پس غلظت مولی این یون برابر با ۰/۰۳ مول بر لیتر می‌شود. از طرفی، می‌دانیم که در محلول هیدروفلئوریک اسید، غلظت یون فلئورید با غلظت یون هیدروژن برابر است؛ پس داریم:

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \Rightarrow \text{pH} = -\log(0.03) = -\log(3 \times 10^{-2}) = -(\log 3 + \log 10^{-2}) = -(0.5 - 2) = 1.5$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-1.5} \text{ mol.L}^{-1}$$

۱۸۳- گزینه ۳ در رابطه با محلول موردنظر، داریم:

$$[\text{H}^+] = M \times \alpha \Rightarrow 10^{-1.5} = 0.01 \times \alpha \Rightarrow \alpha = 0.01$$

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) صابون، یک ترکیب شیمیایی است که هم در آب، هم در چربی‌ها حل می‌شود.

۲) نسبت میان شمار اتم‌ها به شمار عناصر در منیزیم استات با فرمول مولکولی  $\text{Mg}(\text{CH}_3\text{COO})_2$  برابر با  $\frac{15}{4} = 3.75$  است.

۴) در واکنش میان مخلوط سدیم هیدروکسید و آلومینیم با آب، گاز هیدروژن تولید می‌شود. در نقطه مقابل، آب اکسیژنه (محلول هیدروژن پراکسید) در شرایط مناسب به آب و گاز اکسیژن تجزیه می‌شود.


۱۸۴- گزینه ۳

ابتدا غلظت یون هیدروژن را به دست آورده و پس از آن، pH محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \cdot M} \Rightarrow [\text{H}^+] = \sqrt{10^{-5} \times 0.1} = \sqrt{10^{-6}} = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \Rightarrow \text{pH} = -\log 10^{-3} = 3$$

۱۸۵- گزینه ۳ فرمول شیمیایی بنزوئیک اسید به صورت  $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$  و فرمول ساختاری آن به شکل مقابل است:



ابتدا غلظت یون هیدروژن را در محلول نهایی به دست می‌آوریم.

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2.7} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

با توجه به مقدار  $K_a$  بنزوئیک اسید و غلظت یون هیدروژن موجود در محلول، غلظت بنزوئیک اسید حل‌شده در آن (M) را به دست می‌آوریم.

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \cdot M} \Rightarrow 2 \times 10^{-3} = \sqrt{5 \times 10^{-5} \times M} \Rightarrow 4 \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-5} \times M \Rightarrow M = 0.08 \text{ mol.L}^{-1}$$

در مرحله آخر، جرم بنزوئیک اسید مورد نیاز را محاسبه می‌کنیم.

$$? \text{ g C}_7\text{H}_6\text{O}_2 = 500 \text{ mL محلول} \times \frac{1 \text{ L محلول}}{1000 \text{ mL محلول}} \times \frac{0.08 \text{ mol C}_7\text{H}_6\text{O}_2}{1 \text{ L محلول}} \times \frac{122 \text{ g C}_7\text{H}_6\text{O}_2}{1 \text{ mol C}_7\text{H}_6\text{O}_2} = 4.88 \text{ g}$$

۱۸۶- گزینه ۴ با توجه به pH محلول در هر مرحله، مقدار یون هیدروژن موجود در محلول را در هر یک از مراحل به دست می‌آوریم.

$$\text{محلول اولیه: } [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow ? \text{ mol H}^+ = 0.5 \text{ L محلول} \times \frac{10^{-5} \text{ mol H}^+}{1 \text{ L محلول}} = 5 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

$$\text{مرحله اول: } [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow ? \text{ mol H}^+ = 0.5 \text{ L محلول} \times \frac{10^{-3} \text{ mol H}^+}{1 \text{ L محلول}} = 5 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{مرحله دوم: } [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow ? \text{ mol H}^+ = 0.5 \text{ L محلول} \times \frac{10^{-1} \text{ mol H}^+}{1 \text{ L محلول}} = 5 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

بر اثر انحلال هر مولکول HCl در آب، یک یون  $\text{H}^+$  تولید می‌شود؛ پس مقدار افزایش تعداد مول‌های یون  $\text{H}^+$  را می‌توان هم‌ارز با مقدار HCl حل‌شده در محلول در نظر بگیریم.

$$\frac{\text{جرم HCl حل‌شده در محلول در مرحله اول}}{\text{جرم HCl حل‌شده در محلول در مرحله دوم}} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{4.95 \times 10^{-4} \times 36.5}{4.95 \times 10^{-2} \times 36.5} = 0.01$$

۱۸۷- گزینه ۳ با توجه به pH محلول، غلظت یون هیدروژن و درجه یونش مولکول‌های اسید را محاسبه می‌کنیم.

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2.7} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow [\text{H}^+] = M \cdot \alpha \Rightarrow 2 \times 10^{-3} = 0.01 \times \alpha \Rightarrow \alpha = 0.2$$

بر اساس مقدار  $\alpha$  به دست آمده، ثابت یونش اسید موردنظر را در شرایط داده‌شده به دست می‌آوریم.

$$K_a = \frac{\alpha^2 \cdot M}{1 - \alpha} \xrightarrow{\alpha > 0.5} K_a = \frac{(0.2)^2 \times 0.01}{1 - 0.2} = 5 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$



۱۸۸- **گزینه ۲** همون طور که واضحه مقادیر  $\alpha$  و یا  $\frac{K_a}{M}$  قابل محاسبه نیستند، پس مقدار  $(1-\alpha)$  را در فرمول‌های مورد استفاده تأثیر می‌دهیم و از آن صرف‌نظر نمی‌کنیم. براساس pH محلول نهایی، سعی در یافتن غلظت اسید در این محلول می‌کنیم.

$$[H^+] = \alpha \cdot M \Rightarrow 10^{-pH} = \alpha \cdot M \xrightarrow{pH=0} 10^0 = \alpha \cdot M \Rightarrow 1 = \alpha \cdot M$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a \cdot M \cdot (1-\alpha)} \Rightarrow 10^{-pH} = \sqrt{K_a \cdot M \cdot (1-\alpha)} \xrightarrow{pH=0} 10^0 = 1 = \sqrt{1 \times M \times (1-\alpha)} \xrightarrow{\text{طرفین را به توان ۲ می‌رسانیم}} 1 = M(1-\alpha)$$

$$\Rightarrow 1 = M - M\alpha \xrightarrow{1=\alpha \cdot M} 1 = M - 1 \Rightarrow M = 2 \text{ mol.L}^{-1}$$

یه راه دیگه: برای محاسبه غلظت اسید، از روش زیر نیز می‌توانستیم استفاده کنیم:

$$K_a = \frac{M \cdot \alpha^2}{1-\alpha} = \frac{(M \cdot \alpha) \times \alpha}{1-\alpha} \xrightarrow{M \cdot \alpha = [H^+]} K_a = \frac{[H^+] \times \alpha}{1-\alpha} = \frac{10^{-pH} \times \alpha}{1-\alpha} \Rightarrow 1 = \frac{1 \times \alpha}{1-\alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

$$[H^+] = 10^{-pH} = M \cdot \alpha \xrightarrow{\alpha=0.5} 1 = M \times 0.5 \Rightarrow M = 2 \text{ mol.L}^{-1}$$

پس از محاسبه غلظت اسید مورد نیاز (M)، مقدار آن را مشخص می‌کنیم:

$$? \text{ mol HA} = 1 \text{ L محلول} \times \frac{2 \text{ mol HA}}{1 \text{ L محلول}} = 2 \text{ mol}$$

در این شرایط، مقدار درجه یونش ( $\alpha$ ) برابر ۰/۵ به دست می‌آید؛ پس همون بهتر که از مقدار  $(1-\alpha)$  صرف‌نظر نکردیم!

۱۸۹- **گزینه ۲** pH محلول B به اندازه یک واحد بیشتر از pH محلول A است؛ پس داریم:

$$pH_B - pH_A = -\log[H_B^+] - (-\log[H_A^+]) \Rightarrow (a+1) - a = \log[H_A^+] - \log[H_B^+]$$

$$\xrightarrow{[H^+] = \alpha \cdot M} 1 = \log(\alpha_A \cdot M_A) - \log(\alpha_B \cdot M_B) \Rightarrow 1 = \log\left(\frac{\alpha_A \cdot M_A}{\alpha_B \cdot M_B}\right) \Rightarrow 10 = \frac{\alpha_A \cdot M_A}{\alpha_B \cdot M_B} \Rightarrow 10 = \frac{b \times 0.02}{x \times 0.18} \Rightarrow x = 0.4b$$

۱۹۰- **گزینه ۴** چون درجه یونش هیدروکلریک اسید برابر یک است، در محلول این اسید غلظت مولی یون هیدروژن با غلظت اسید حل‌شده برابر است؛ پس در محلول ۰/۰۱ مولار هیدروکلریک اسید، غلظت یون هیدروژن برابر ۰/۰۱ مول بر لیتر می‌شود. برای آن که pH محلول اسید HA با pH محلول ۰/۰۱ مولار هیدروکلریک اسید برابر شود، غلظت یون هیدروژن در محلول این اسید نیز باید برابر ۰/۰۱ مول بر لیتر باشد.

$$[H^+] = \sqrt{K_a \cdot M} \Rightarrow 0.01 = \sqrt{5 \times 10^{-5} \times M} \Rightarrow 10^{-4} = 5 \times 10^{-5} \times M \Rightarrow M = 2 \text{ mol.L}^{-1}$$

با توجه به محاسبات فوق، غلظت محلول اسید HA باید ۲ مول بر لیتر باشد که این مقدار، ۲۰۰ برابر غلظت محلول هیدروکلریک اسید است.

۱۹۱- **گزینه ۱** در گام اول، مقدار مول‌های یون هیدروژن تولیدشده را براساس مقدار انرژی آزادشده محاسبه می‌کنیم.

$$? \text{ mol H}^+ = 30.4 \text{ kJ} \times \frac{2 \text{ mol H}^+}{76 \text{ kJ انرژی}} = 0.8 \text{ mol}$$

در مرحله بعد، غلظت یون هیدروژن را به دست آورده و پس از آن pH محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$\text{غلظت مولی یون هیدروژن} = \frac{\text{مول یون هیدروژن}}{\text{حجم محلول}} \Rightarrow [H^+] = \frac{0.8 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0.4 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$pH = -\log[H^+] \Rightarrow pH = -\log\frac{4}{10} = -(\log 4 - \log 10) = -(\log 4 - 1) = 0.6$$

۱۹۲- **گزینه ۴** هیدروژن برمید یک اسید قوی با  $\alpha = 1$  است؛ پس ابتدا pH محلول این اسید را محاسبه می‌کنیم.

$$? \text{ mol H}^+ = 0.81 \text{ g HBr} \times \frac{1 \text{ mol HBr}}{81 \text{ g HBr}} \times \frac{1 \text{ mol H}^+}{1 \text{ mol HBr}} = 0.01 \text{ mol}$$

$$[H^+] = \frac{\text{مول یون هیدروژن}}{\text{حجم محلول}} \Rightarrow [H^+] = \frac{0.01 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 0.01 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$pH = -\log[H^+] \Rightarrow pH = -\log(0.01) = 2$$

در مرحله بعد، pH محلول هیدروسیانیک اسید را محاسبه می‌کنیم. توجه داریم که این ترکیب یک اسید ضعیف بوده و  $\alpha$  آن کوچک‌تر از ۱ است.

$$? \text{ mol HCN} = 0.81 \text{ g HCN} \times \frac{1 \text{ mol HCN}}{27 \text{ g HCN}} = 0.03 \text{ mol} \quad [HCN] = \frac{\text{مول HCN}}{\text{حجم محلول}} = \frac{0.03 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 0.03 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a \cdot M \cdot (1-\alpha)} \xrightarrow{\frac{K_a}{M} < 0.025} [H^+] = \sqrt{K_a \cdot M} \Rightarrow [H^+] = \sqrt{4/32 \times 10^{-10} \times 0.03} = 3/6 \times 10^{-6}$$

$$pH = -\log[H^+] \Rightarrow pH = -\log(3/6 \times 10^{-6}) = -\log(36 \times 10^{-7}) = -(\log 6^2 + \log 10^{-7}) = -(1/6 - 7) = 5/4$$

همان‌طور که مشخص است، pH این محلول‌ها تقریباً به اندازه ۳/۴ واحد با یکدیگر تفاوت دارد.



۱۹۳- گزینه ۴

ابتدا شمار مول‌های هیپوکلرو اسید تولیدشده را محاسبه کرده و غلظت این اسید را به دست می‌آوریم.

$$? \text{ mol HClO} = 130 / 5 \text{ g Cl}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol Cl}_2\text{O}}{87 \text{ g Cl}_2\text{O}} \times \frac{2 \text{ mol HClO}}{1 \text{ mol Cl}_2\text{O}} = 3 \text{ mol}$$

$$[\text{HClO}] = \frac{\text{مول HClO}}{\text{حجم محلول}} \Rightarrow [\text{HClO}] = \frac{3 \text{ mol}}{4 \text{ L}} = 0.75 \text{ mol.L}^{-1}$$

با توجه به غلظت محلول،  $K_a$  اسید حل شده در آن، ابتدا غلظت یون هیدرونیوم و پس از آن، pH محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \cdot M \cdot (1 - \alpha)} \xrightarrow{\frac{K_a < 0.025}{M}} [\text{H}^+] = \sqrt{K_a \cdot M} \Rightarrow [\text{H}^+] = \sqrt{0.75 \times 3 \times 10^{-8}} = \frac{3}{4} \times 10^{-4}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{3}{4} \times 10^{-4}\right) = -(\log 3 - \log 4 + \log 10^{-4}) = 3.8$$

با انحلال HF(g) در محلول، pH از ۲ به ۱/۳ می‌رسد. غلظت یون هیدروژن را در محلول اولیه و نهایی محاسبه می‌کنیم.

۱۹۴- گزینه ۱

$$\text{محلول اولیه: } [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{محلول نهایی: } [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-1/3} = 5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

با توجه به محاسبات انجام شده، برای کاهش pH این محلول به اندازه ۰/۷ واحد، غلظت یون هیدروژن باید ۵ برابر شده و به اندازه  $4 \times 10^{-2}$  مول بر لیتر افزایش پیدا می‌کند. توجه داریم که این مقدار از یون هیدروژن، باید توسط یونش مولکول‌های HF تولید شود؛ پس داریم:

$$[\text{H}^+] = \alpha \cdot M \Rightarrow 4 \times 10^{-2} = 0.2 \times M \Rightarrow M = 2 \text{ mol.L}^{-1}$$

بر این اساس، برای آن که غلظت یون هیدروژن به  $5 \times 10^{-2}$  مول بر لیتر برسد، باید دو مول HF در هر لیتر از این محلول حل شود. ابتدا مول‌های گاز HF را محاسبه کرده و پس از آن، حجم گاز را به دست می‌آوریم.

$$? \text{ mol HF} = 5 \text{ L محلول} \times \frac{2 \text{ mol HF}}{1 \text{ L محلول}} = 10 \text{ mol}$$

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{n_1 \cdot T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{n_2 \cdot T_2} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1 \cdot n_2 \cdot T_2}{P_2 \cdot n_1 \cdot T_1} \Rightarrow \frac{V_2}{22/4} = \frac{1 \times 10 \times (273 + 39)}{1 \times 1 \times 273} \Rightarrow V_2 = 256 \text{ L}$$

۱۹۵- گزینه ۳

ابتدا غلظت یون هیدروژن را در محلول محاسبه می‌کنیم و پس از آن، غلظت اسید مورد نیاز را به دست می‌آوریم.

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{H}^+] = \alpha \cdot M \Rightarrow 10^{-3} = 0.1 \times M \Rightarrow M = 0.01 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$K_a = \frac{\alpha^2 \cdot M}{1 - \alpha} \Rightarrow K_a = \frac{(0.1)^2 \times 0.01}{1 - 0.1} = \frac{1 \times 10^{-4}}{0.9} = 1/11 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

۱۹۶- گزینه ۲ حجم‌های برابر از گازهای HCl و HF، شامل مول‌های برابری از این مواد می‌شوند. پس از انحلال این گازها در محلول‌های موردنظر، مولکول‌های HCl به طور کامل یونیده شده و به یون‌های مثبت و منفی تبدیل می‌شوند؛ در حالی که مولکول‌های HF به طور جزئی یونیده می‌شوند و شمار زیادی از آن‌ها به طور دست‌نخورده در محلول باقی می‌مانند؛ بنابراین مجموع غلظت مولی مواد در محلول هیدروکلریک اسید (بازوی B) بیشتر از محلول دیگر (بازوی A) است و با مرور زمان، مولکول‌های آب از خلال غشا به سمت محلول موجود در بازوی B حرکت می‌کنند. با حرکت مولکول‌های آب به سمت بازوی B، مقدار آب موجود در این محلول بیشتر شده و غلظت یون‌های محلول در آن کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، رسانایی الکتریکی این محلول هم کاهش پیدا می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) به مرور زمان، آب از بازوی A به سمت بازوی B رفته و ارتفاع محلول در بازوی A کاهش پیدا می‌کند.

۲) در محلول موجود در بازوی A، به مرور زمان غلظت اسید افزایش پیدا کرده و به دنبال آن pH محلول کاهش پیدا می‌کند.

۴) با گذشت زمان، شمار یون‌های موجود در محلول ریخته شده در بازوی B تغییری نمی‌کند اما غلظت این یون‌ها کاهش پیدا می‌کند.

۱۹۷- گزینه ۳

پس از محاسبه غلظت یون هیدروژن در محلول، pH آن را به دست می‌آوریم.

$$K_a = \frac{\alpha^2 \cdot M}{1 - \alpha} \xrightarrow{\frac{K_a > 0.025}{M}} 0.1 = \frac{\alpha^2 \times 0.2}{1 - \alpha} \Rightarrow 0.2\alpha^2 + 0.1\alpha - 0.1 = 0$$

آله از درس ریاضی یادتون باشه، ریشه‌های یک معادله درجه دو که صورت آن به شکل  $ax^2 + bx + c = 0$  است، از رابطه  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  به دست می‌آید. بر این اساس، ریشه‌های معادله موردنظر برابر با -۱ و ۰/۵ می‌شوند. کاملاً واضحه که مقدار  $\alpha$  برای یک اسید نمی‌تواند منفی باشد؛ پس مقدار  $\alpha$  اسید موردنظر برابر ۰/۵ می‌شود.

$$[\text{H}^+] = \alpha \cdot M \Rightarrow [\text{H}^+] = 0.5 \times 0.2 = 0.1 \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow \text{pH} = -\log[\text{H}^+] \Rightarrow \text{pH} = -\log(0.1) = 1$$